

Evaluation of Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) as a Marker to Determine the Extent of Disease in Patients with Preeclampsia

Jafari Zare SH^{1*}, Jafary R², Motavalli R³

1. Department of Gynecology, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2. Student Research Committee, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

3. Department of Midwifery, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

*Corresponding author. Tel: +984533254727, Fax: +984533715514, E-mail: sh.jafarizare@yahoo.com

Received: Oct 22, 2016 Accepted: Dec 31, 2016

ABSTRACT

Background & objectives: Early diagnosis of preeclampsia and its severity in pregnant women is greatly important for controlling this disease and preventing subsequent dangers for mother and the fetus. Current study is conducted to assess neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) as a determining factor for the severity of the disease in patients with preeclampsia referring to Sabalan hospital, Ardabil.

Methods: This was a case control study on 50 pregnant women with severe preeclampsia (group 1), 50 pregnant women with mild preeclampsia (group 2), and 50 healthy pregnant women (group 3). The groups were homogenized for basic variants including age, gestational age, mean BMI, gravid and parity. Required information including age, gestational week, BMI, gravid, parity, 24-hour urine protein, systolic and diastolic blood pressure, and NLR were obtained and analyzed.

Results: The NLR was significantly higher in women with severe preeclampsia compared with mild preeclampsia ($p=0.031$) and healthy women ($p<0.001$). NLR did not show difference between mild preeclampsia and healthy women ($p=0.209$). Significant positive correlation was also observed between NLR and proteinuria ($p<0.0001$, $r=0.558$), systolic blood pressure ($p=0.0026$, $r=0.244$), and diastolic blood pressure ($p=0.0028$, $r=0.242$).

Conclusion: This study showed that maternal NLR can be used as a marker for preeclampsia severity.

Keywords: Neutrophil; Lymphocyte; Pre-eclampsia; Illness severity; Pregnant Women.

بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) به عنوان یک مارکر تعیین‌کننده شدت بیماری در بیماران مبتلا به پرهاکلامپسی

شبیم جعفری زارع^۱، رویا جعفری^۲، رویا متولی^۳

۱. گروه زنان، واحد اداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران ۲. کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد اداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
۳. گروه مامایی، واحد اداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

*نویسنده مسئول. تلفن: ۰۴۵۳۳۷۵۴۷۷۷ - فاکس: ۰۴۵۳۳۷۱۵۸۱۴. پست الکترونیک: sh.jafarizare@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص زودهنگام زنان باردار مبتلا به پرهاکلامپسی و شدت آن در کنترل این بیماری و پیشگیری از خطرات بعدی برای مادر و جنین بسیار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک مارکر تعیین‌کننده شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده با پرهاکلامپسی به بیمارستان سبلان اردبیل انجام گرفت.

روش کار: مطالعه از نوع مورد شاهدی بود. ۵۰ زن باردار با پرهاکلامپسی شدید (گروه ۱)، ۵۰ زن باردار با پرهاکلامپسی خفیف (گروه ۲)، و ۵۰ زن باردار سالم (گروه ۳) وارد طرح شد. زنان مورد بررسی در این سه گروه از لحاظ متغیرهای پایه شامل سن، سن حاملگی، میانگین شاخص توده بدن، گراوید، و پاریته همگن سازی شده بودند. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، هفتگه بارداری، گراوید، و پاریته، پروتئین ادرار ۲۴ ساعته، فشار خون سیستول و دیاستول، و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت جمع‌آوری و با توجه به هدف مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجیه بیشتر از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف ($P < 0.001$) و زنان سالم ($P < 0.001$) بود. نسبت نوتروفیل به لنفوسیت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف و سالم تفاوتی با یکدیگر نداشت ($P = 0.9$). بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با پروتئینوری ($P < 0.001$ ، $P = 0.058$ ، $P = 0.026$ ، $P = 0.024$ ، $P = 0.028$)، فشار خون سیستول (۰.۲۶)، فشار خون دیاستول (۰.۲۴۴)، و فشار خون دیاستول یک همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت ($P < 0.001$).

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که می‌توان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت مادری را به عنوان یک نشانگر در ارزیابی شدت پرهاکلامپسی به کار برد.

واژه‌های کلیدی: نوتروفیل، لنفوسیت، پرهاکلامپسی، شدت بیماری، زنان باردار.

دریافت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

پرهاکلامپسی با وجود فشارخون بیشتر از ۹۰/۱۴
میلی متر جیوه و پروتئینوری ۱ مثبت در نمونه تصادفی ادرار (یا دفع روزانه ۳۰۰ میلی گرم پروتئین از راه ادرار) مشخص می‌گردد. تشخیص پرهاکلامپسی شدید از نوع خفیف آن نیز با فشار خون دیاستولی ۱۱۰ میلی متر جیوه یا بالاتر، پروتئینوری دو مثبت یا

مقدمه

افزایش فشار خون در دوران بارداری از اهمیت بالینی ویژه‌ای برخوردار است. زیرا یکی از عوامل مرگ و میر در مادر و جنین بوده و از طرف دیگر، یکی از موارد مهم اشغال تخت‌های بیمارستانی و استفاده از امکانات و منابع مراقبت‌های قبل از تولد می‌باشد [۱].

نفوذ کرده و در نتیجه منجر به ایجاد التیاب عروقی می‌شوند [۵,۶].

علیرغم بررسی‌های متعدد، هیچگونه آزمون غربالگری قابل اعتماد، معتبر، و اقتصادی برای پره‌اکلامپسی وجود ندارد و تنها با مراقبت‌های برنامه‌ریزی شده قبل از زایمان می‌توان پره‌اکلامپسی را در مراحل اولیه تشخیص داد [۶]. در یک مطالعه کوهورت بزرگ، پیامدهای وخیم مادری و نوزادی پره‌اکلامپسی شدید بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ در بین ۲۱۰۶۱ زن باردار در کشور انگلستان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که پیامدهای وخیم مادری از جمله ادم ریوی، نارسایی کلیه، کبدی و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید به مرتب بیشتر است [۷]: همچنین مطالعه‌ای روی ۵۹۸ زن باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی خفیف و شدید نشان داد که خطر نسی و قوع زایمان زودرس و تولد نوزاد کوچک نسبت به سن بارداری در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید حدود ۳ برابر زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی خفیف بود [۸]. از این رو، علاوه بر شناسایی موارد کلی پره‌اکلامپسی، شناسایی و پیش‌بینی موارد پره‌اکلامپسی شدید از خفیف با توجه به وحامت پی‌آمدهای مادری و نوزادی اهمیت زیادی دارد. در چند سال اخیر، شواهد نشان داده‌اند که در زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی خفیف و شدید، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به طور قابل توجهی بیشتر از زنان باردار سالم است [۹,۱۰,۱۱]. البته برخی از مطالعات نیز تفاوتی بین این گروه‌ها از لحاظ نسبت نوتروفیل به لنفوسیت نشان نداده‌اند [۱۲,۱۳].

با توجه به اهمیت کلی تشخیص موارد مبتلا به پره‌اکلامپسی و نیز اهمیت مضاعف تشخیص موارد پره‌اکلامپسی شدید از خفیف و با توجه مورد سؤال بودن ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با بروز پره‌اکلامپسی و شدت آن، و از آنجا که تا کنون در هیچ مطالعه‌ای در سطح استان و حتی کشور این مساله

بیشتر، کراتینین بالا، افزایش آشکار در آنزیم‌های کبدی و وجود سردرد، اختلال بینایی، درد ناحیه فوقانی شکم، الیگوری، ترومبوسیتوپنی و ادم ریوی تمایز می‌گردد [۳,۲]. پره‌اکلامپسی، ۵ تا ۱۰ درصد کل بارداری‌ها را شامل شده و عوارض زیادی برای مادر و جنین دارد به طوری که سالیانه ۵۰۰۰۰ زن در کل جهان در اثر ابتلا به پره‌اکلامپسی و عوارض آن جان می‌سپارند [۴]. این مشکل بیشتر در بارداری‌های نخستین روی می‌دهد. بانوانی که یک بار به این مشکل دچار می‌شوند، در بارداری‌های بعدی خود نیز احتمالاً بروز دوباره آن را تجربه می‌کنند؛ ولی، به ندرت احتمال دارد خانمی که در بارداری‌های قبلی خود به آن دچار نشده است، در بارداری‌های بعدی به آن مبتلا شود [۵]. از عوامل خطرساز پره‌اکلامپسی می‌توان به نولی پاریتی، بیماری عروقی یا مزمن همانند دیابت قبل از بارداری، بیماری کلیوی، هیپرتانسیون مزمن، بیماری روماتیسمی، حاملگی مولار، بارداری چند قلویی، عفونت‌های مادری، ژنهای حساس کننده مادری، سن بسیار بالای مادر اشاره کرد [۱-۳]. مسؤول ایجاد پره‌اکلامپسی همچنان ناشناخته باقی مانده است، ولی یکی از عوامل مسئول ایجاد کننده پره‌اکلامپسی شامل نقص یا افزایش پاسخ ایمنی می‌باشد [۱,۳].

تغییرات ایمونولوژیک ناشی از حاملگی مثل مشکلات موضعی مرتبط با جفت یا اثرات گستردگی سیستمیک نظیر افزایش شدت برخی از عفونت‌های خاص در طی حاملگی در برخی از زنان باردار مشاهده می‌شود اما پس زمینه‌ی مکانیسم‌های بیوشیمیایی مسئول این تغییرات ایمونولوژیک هنوز به طور واضح توصیف نشده است [۶]. لنفوسیت‌ها بخشی از سیستم ایمنی تطبیقی هستند که برای مقابله با بیماری‌ها، آنتی‌بادی تولید می‌کنند. تصور می‌شود نوتروفیل‌ها خط اول دفاع علیه عفونت‌ها در محل زخم هستند، اما در مطالعات اخیر گزارش شده است که در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، نوتروفیل‌ها در بافت عروق سیستمیک

متخصصین زنان و زایمان بود، یعنی فشار خون سیستولیک بیش از 140 mmHg و فشار خون دیاستولیک بیش از 90 mmHg بعد از هفته ۲۰ بارداری و دفع پرتوئین در ادرار ۲۴ ساعته بیشتر از ۳۰ mg یا پرتوئین اوری بیشتر از $+1$ به عنوان پره‌اکلامپسی خفیف، و فشار خون دیاستولیک بیش از 110 mmHg یا پرتوئینوری بیشتر از $+2$ یا وجود علائمی همزممان با افزایش فشار خون مانند سردرد، الیگوری، افزایش کراتینین سرم، ترومبوسیتوپنی، افزایش آنزیم‌های کبدی، ادم ریوی به عنوان پره‌اکلامپسی شدید تلقی شد (طبق تعریف کمیته ترمینولوژی کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا) [۱۴]. زنان مورد بررسی در این سه گروه از لحاظ متغیرهای پایه شامل سن، سن حاملگی، میانگین شاخص توده بدن، گراوید، و پاریته همگن سازی شدند. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، هفته بارداری، پرتوئین ادرار ۲۴ ساعته، فشار خون سیستول و دیاستول، و نسبت نوتروفیل به لنفوسيت درج شده از پرونده بیمار جمع‌آوری شد.

در بیمارستان برای اندازه گیری فشارخون بیماران، به منظور جلوگیری از خطاهای اندازه گیری، کاف با اندازه مناسب انتخاب شده (طول کف $1/5$ برابر محیط بازو و یا تیوب کاف، 80 درصد یا بیشتر از بازو را بپوشاند). ده دقیقه بعد از قرارگرفتن بیمار در وضعیت نشسته در شرایطی که بازو هم سطح قلب قرار گرفته باشد، اندازه گیری شده بود. تمام بیماران در طی سی دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون، هیچ خوراکی و نوشیدنی از راه دهان مصرف نکرده بودند. در آزمایشگاه برای شمارش سلولی ازدستگاه Sysmex مدل KX-21N و برای تعیین درصد نوتروفیل و لنفوسيت از روش چشمی یا میکروسکوپ نوری و رنگ آمیزی گیمسا استفاده شده بود.

جهت بررسی متغیرهای مطالعه برای هر بیمار، چک لیستی شامل گزینه‌های سن بیمار، سطح نوتروفیل، سطح لنفوسيت، نسبت نوتروفیل به لنفوسيت، پرتوئین

مورد بررسی قرار نگرفته است، تصمیم بر آن شد تا مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسيت^۱ به عنوان یک مارکر تعیین‌کننده شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده با پره‌اکلامپسی به بیمارستان سبلان اردبیل انجام گیرد.

روش کار

در این مطالعه که از نوع مورد شاهدی بود، ۵۰ زن باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید (گروه ۱)، ۵۰ زن باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی خفیف (گروه ۲)، و ۵۰ زن باردار سالم (گروه کنترل) از بین زنان با بارداری تک قلوبی نخست زا و چندزا که به منظور مراقبت‌های دوران بارداری به بخش زنان و زایمان بیمارستان سبلان اردبیل مراجعه کرده بودند، انتخاب و وارد طرح شدند.

جامعه آماری در این مطالعه عبارت بود از زنان با بارداری تک قلوبی نخست زا و چندزا که به منظور مراقبت‌های دوران بارداری به بخش زنان و زایمان بیمارستان سبلان اردبیل مراجعه کرده بودند. حجم نمونه مطالعه حاضر با استفاده از فرمول حجم نمونه و با توجه به تحقيقات قبلی انجام گرفته در اين زمينه [۹] در هر گروه 50 نفر محاسبه شد.

ابزار پژوهش در این مطالعه فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات بود. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به صورت میدانی بود.

شرایط خروج از مطالعه عبارت بود از عدم رضایت به نمونه گیری، ابتلاء به هر نوع بیماری طی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، هایپرتانسیون، بیماری کبدی، کم کاری یا پرکاری تیروئید، بیماری عفونی، دیابت، بیماری کلیه، عدم وجود سابقه عفونت‌های سیستمیک از قبل از بارداری، همچنین چندقلوبی و مصرف هر نوع دارو به جز اسیدفولیک، مولتی ویتامین یا فرسولین. معیارهای انتخاب بیماران پره‌اکلامپسی و تعیین شدت آن براساس تعریف کالج آمریکایی

^۱ NLR

میانگین تعداد گرواید در زنان مورد مطالعه در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید به ترتیب $1/16 \pm 1/11$ ، $3/26 \pm 1/26$ ، و $3/12 \pm 1/1$ بود و سه گروه از این لحاظ تفاوت معنی داری نداشتند ($p=0.577$). میانگین تعداد پاریته در زنان مورد مطالعه در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید به ترتیب $1/19 \pm 1/8$ ، $2/0.2 \pm 1/15$ ، و $2/0.3 \pm 1/11$ بود و سه گروه از این لحاظ تفاوت معنی داری نداشتند ($p=0.443$) (جدول ۱). میانگین فشار خون سیستول بین سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید با یکدیگر اختلاف معنی داری داشت ($p<0.001$). بطوری که میانگین فشار خون سیستول زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجهی هم از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف ($p<0.001$) و هم از زنان سالم ($p<0.001$) بیشتر بود و میانگین فشار خون سیستول زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف به طور قابل توجهی از زنان سالم بیشتر بود ($p<0.001$). میانگین فشار خون دیاستول زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجهی هم از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف ($p<0.001$) و هم از زنان سالم ($p<0.001$) بیشتر بود. و نیز میانگین فشار خون دیاستول زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف به طور قابل توجهی از زنان سالم بیشتر بود ($p<0.001$). میانگین پرتوئینوری ۲۴ ساعته در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید ($1292/4 \pm 885/3$ میلی گرم) به طور قابل توجهی نسبت به زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف ($799/1 \pm 277/7$ میلی گرم) بیشتر بود ($p<0.001$).

به منظور تعیین ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با ابتلا به پرهاکلامپسی، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در بین دو گروه زنان سالم و زنان مبتلا به پرهاکلامپسی (چه خفیف و چه شدید) مقایسه شد که

ادرار ۲۴ ساعته، فشارخون سیستول و دیاستول بیمار و سن بارداری از اطلاعات موجود در پرونده تکمیل گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از روش آماری تی تست^۱ و انوای یک طرفه^۲ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام گرفت. سطح معنی داری در تمام موارد کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته ها

افراد شرکت کننده در مطالعه در سه گروه زنان سالم (گروه ۱)، زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف (گروه ۲)، و زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید (گروه ۳) از نظر متغیرهای سن، سن حاملگی، شاخص توده بدن، گرواید، و پاریته همگن سازی شدند.

میانگین سن زنان مورد مطالعه در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید به ترتیب $28/84 \pm 3/43$ ، $28/84 \pm 3/43$ ، و $29/96 \pm 4/05$ سال بود و سه گروه از لحاظ میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند ($p=0.209$).

میانگین سن حاملگی در زنان مورد مطالعه در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید به ترتیب $36/22 \pm 1/89$ ، $36/1 \pm 1/94$ ، و $35/92 \pm 1/72$ ماه بود و سه گروه از لحاظ میانگین سن حاملگی تفاوت معنی داری نداشتند ($p=0.713$).

میانگین شاخص توده بدن زنان مورد مطالعه در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید به ترتیب $24/59 \pm 4/41$ ، $26/25 \pm 3/9$ ، و $25/40 \pm 5/1$ کیلو گرم بر متر مربع بود و سه گروه از لحاظ میانگین شاخص توده بدن تفاوت معنی داری نداشتند ($p=0.181$).

¹ T-Test

² One-Way ANOVA

پرهاکلامپسی به طور قابل توجهی بیشتر از زنان سالم بود ($p=0.001$).

نتایج در جدول ۲ مشاهده می‌شود. طبق جدول ۲، نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در زنان مبتلا به

جدول ۱. میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن، سن حاملگی، شاخص توده بدنی، گراوید، و پاریته در سه گروه

آزمون ANOVA			گروه ۳ (پرهاکلامپسی شدید)	گروه ۲ (پرهاکلامپسی خفیف)	گروه ۱ (سالم)	گروه متغیر
P-Value	df Total	F				
.۰/۰۹	۱۴۹	۱/۵۸۱	۲۹/۹۶±۴/۰۵	۳۰/۰۴±۳/۸۱	۲۸/۸۴±۳/۴۳	سن
.۰/۷۱۳	۱۴۹	.۰/۳۳۹	۳۵/۹۲±۱/۷۲	۳۶/۲۲±۱/۸۹	۳۶/۱±۱/۹۴	سن حاملگی
.۰/۱۸۱	۱۴۹	۱/۷۲۹	۲۵/۴±۵/۰۱	۲۶/۲۵±۳/۹	۲۴/۵۹±۴۱/۴	شاخص توده بدنی
.۰/۵۷۷	۱۴۹	.۰/۵۵۲	۳/۱۲±۱/۱	۳/۲±۱/۲۶	۳/۳۶±۱/۱۶	گراوید
.۰/۴۴۳	۱۴۹	.۰/۸۱۹	۲/۰۲±۱/۱۵	۲/۰۳±۱/۱۱	۲/۰۸±۱/۱۹	پاریته

جدول ۲. میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در دو گروه سالم و مبتلا به پرهاکلامپسی

آزمون تی تست			گروه متغیر	
P-Value	Df	آماره	زنان مبتلا به پرهاکلامپسی	زنان سالم
.۰/۰۰۱	۱۴۸	۳/۲۴۵	۵/۴۸۸±۳/۰۸	۳/۹۸±۱/۶

نوتروفیل به لنفوسيت در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجهی از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف بیشتر بود ($p=0.031$).

میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجهی از زنان سالم بیشتر بود ($p<0.001$). ولی میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف و زنان سالم تفاوتی با یکدیگر نداشت ($p=0.9$).

به منظور تعیین ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت با شدت پرهاکلامپسی، نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در بین سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید مقایسه شد که نتایج در جدول ۳ مشاهده می‌شود. میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در سه گروه سالم، پرهاکلامپسی خفیف، و پرهاکلامپسی شدید با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشت ($p<0.001$). بطوری‌که میانگین نسبت

جدول ۳. میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت در سه گروه مورد مطالعه

آزمون ANOVA			گروه ۳ (پرهاکلامپسی شدید)	گروه ۲ (پرهاکلامپسی خفیف)	گروه ۱ (سالم)	گروه متغیر
P-Value	df Total	F				
$p<0.001$	۱۴۹	۱۰/۰۶۷	۶/۲۷±۳/۵۳	۴/۷±۲/۳۴	۳/۹۸±۱/۶	نسبت نوتروفیل به لنفوسيت

فشار خون دیاستول یک همبستگی مثبت معنی‌دار قوی وجود داشت ($p=0.0028$, $p=0.242$).

بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسيت به عنوان یک مارکر تعیین‌کننده شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده با پرهاکلامپسی به بیمارستان سبلان اردبیل انجام گرفت. به طور خلاصه،

به منظور تعیین همبستگی بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت با میزان پروتئینوری و فشار خون از آزمون پیرسون استفاده شد، که نتایج حاصله به شرح زیر بود: بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت با پروتئینوری یک همبستگی مثبت معنی‌دار خیلی قوی وجود داشت ($p=0.058$). بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت با فشار خون سیستول ($p=0.0026$, $p=0.244$) و نیز بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت با

عروق سیستمیک نفوذ یافته بودند، رنگ آمیزی نوتروفیل‌ها در ۷۰ درصد از عروق در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی مشخص شد، در حالی که وجود لنفوسیت‌ها تنها در ۳۳ درصد از عروق دیده شد و در عروقی که از نظر وجود لکوسیت‌ها مثبت بودند، شمار نوتروفیل‌ها در عروق سه برابر بیشتر از لنفوسیت‌ها بود [۲۶]. گزارش شد که تعداد نوتروفیل‌ها قبل از هفته ۳۰ بارداری، در حاملگی‌های طبیعی، ۲/۵ برابر افزایش می‌یابد که این میزان در بیماران مبتلا به پرهاکلامپسی شدیدتر است [۲۷]. این افزایش تعداد نوتروفیل‌ها در بارداری را نتیجه افزایش سطح عوامل تحریک کننده کلونی می‌دانند [۲۸]. در مطالعه‌ای دیگر، یک نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به طور قابل توجه بالایی در بیماران مبتلا به پرهاکلامپسی در مقایسه با حاملگی‌های سالم گزارش شد. به علاوه، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به طور قابل توجهی در گروه پرهاکلامپسی شدید در مقایسه با گروه پرهاکلامپسی خفیف بالاتر بود [۹].

کانزونری^۲ و همکاران دریافتند که شمار کلی لکوسیت‌ها در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید، در مقایسه با زنان باردار سالم، به طور قابل توجهی افزایش شاهد زنان باردار سالم، به طور قابل توجهی افزایش یافته است: $10/66 \pm 3/7$ در برابر به ترتیب $8/55 \pm 1/93$ و $9/47 \pm 2/59$ (میانگین). همچنین در مطالعه آنها افزایش شمار کلی لکوسیت‌ها عمدهً ناشی از افزایش تعداد نوتروفیل‌ها بود: $1/0.5 \pm 4/8$ (شدید) به ترتیب در برابر $2/23$ و $6/69 \pm 2/6$ (خفیف) و $5/9 \pm 1/79$ (شاهددها) [۲۹].

لوری^۳ و همکاران گزارش کردند که تعداد مطلق نوتروفیل‌ها به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا به پرهاکلامپسی در مقابل گروه شاهد با حاملگی بدون عارضه، افزایش یافته است. افزایش نوتروفیل‌ها در بیماران مبتلا به پرهاکلامپسی شدید در مقایسه با

باتوجه به اهداف پژوهش حاضر، نشان داده شد که نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در مجموع در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی (خفیف و شدید) به طور قابل توجیه بیشتر از زنان سالم است. ($p=0.001$): همچنین، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی شدید به طور قابل توجیه بیشتر از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف ($p=0.031$) و زنان سالم ($p=0.001$) بود؛ ولی، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی خفیف و سالم تفاوتی با یکدیگر نداشت ($p=0.209$). بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با پروتئینوری ($p=0.001$) و فشار خون سیستول ($p=0.026$)، فشار خون دیاستول یک همبستگی مثبت معنی‌دار وجود داشت ($p=0.024$).^۴

در مطالعات انجام شده در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی، محتمل است که نوتروفیل‌ها در حین گردش در فضای درون ویلوسی فعال شوند و در معرض لپیدهای اکسید شده ترشحی توسط جفت قرار گیرند [۱۸-۱۵]. لپیدهای اکسید شده می‌توانند نوتروفیل‌ها را فعال کنند که منجر به بیان COX-2 می‌شود که آنزیم اصلی در فرآیندهای التهابی بوده و آزاد شدن ترومبوکسان، TNF و سوپراکسید را تنظیم می‌کند [۱۹، ۲۰]. نوتروفیل‌های به دست آمده از زنان مبتلا به پرهاکلامپسی در مقایسه با زنان حامله سالم یا زنان غیرحامله سالم، به طور قابل توجهی، COX-2 بیشتری بیان کردند [۲۱-۲۴].

اویلوملو^۱ و همکاران [۲۵] در مطالعه خود، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در گروه پرهاکلامپسی را در مقایسه با گروه شاهد به طور قابل توجهی بالاتر گزارش کردند ($5/3 \pm 3/7$ در برابر $1/1 \pm 1/3$: $p=0.001$). در مطالعه‌ای دیگر، هر چند همه گروه‌های لکوسیت‌های در گردش خون مادری در زنان مبتلا به پرهاکلامپسی فعال شده بودند، تنها نوتروفیل‌ها به طور قابل توجهی در ساختارهای

² Canzoneri

³ Lurie

⁴ Oylumlu

وجود نداشت، از این رو در پژوهش‌های بعدی پیشنهاد می‌شود که نمونه‌گیری خون و انجام آزمایشات مربوطه و اندازه‌گیری فشارخون بیمار توسط خود پژوهشگر انجام گیرد.

نتیجه گیری

طبق یافته‌های مطالعه حاضر بنظر می‌رسد که می‌توان نسبت نوتروفیل به لنفوسيت مادری را به عنوان یک نشانگر در ارزیابی شدت پره‌اکلامپسی به کار برد. با در نظر گرفتن این یافته مطالعه حاضر و نیز توجه به یافته‌های مطالعات مشابه مبنی بر وجود ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسيت و پره‌اکلامپسی، می‌توان از نسبت نوتروفیل به لنفوسيت به عنوان یک نشانگر نویدبخش برای تشخیص زودهنگام شدت پره‌اکلامپسی شدید یاد کرد و برای اینکه بتوان از آن به صورت روتین در بالین استفاده کرد نیاز به کارآزمایی‌های حمایتی بیشتری است.

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم رویا جعفری دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می‌باشد. بدین وسیله از کلیه مسئولین دانشگاه و کارکنان بیمارستان سبلان اردبیل که در اجرای صحیح پژوهه تحقیقاتی محققین را یاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی می‌گردد.

پره‌اکلامپسی خفیف، بر جسته‌تر بوده است. تعداد مطلق لنفوسيت و ائوزینوفیل در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی در مقابل حاملگی‌های بدون عارضه، کاهش یافته بود، در حالی که شمار مونوسیت‌ها و بازووفیل‌ها تغییر تکرده بودند [۲۷].

در مطالعه‌ای دیگر در همین زمینه توسط یاوزکان^۱ و همکاران [۱۳]، مقایسه‌ای بین بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی و بیماران سالم از نظر میانگین حجم پلاکت (MPV)، نسبت نوتروفیل به لنفوسيت و نسبت پلاکت به لنفوسيت (PLR) انجام شد. در نتیجه‌ی این مطالعه، مشخص شد که نسبت نوتروفیل به لنفوسيت به طور قابل توجیه در گروه بیمار پره‌اکلامپسی در مقایسه با گروه سالم، بالاتر بود.

در مطالعه‌ای دیگر نیز نسبت نوتروفیل به لنفوسيت نیز به طور قابل توجیه در گروه مبتلا به پره‌اکلامپسی در مقایسه با گروه سالم بیشتر بود، ولی مشخص شد که نسبت نوتروفیل به لنفوسيت برای تعیین شدت پره‌اکلامپسی در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی کافی نیست. اما مشخص گردید که نسبت نوتروفیل به لنفوسيت می‌تواند در تعیین پره‌اکلامپسی در حاملگی‌های پر خطر مفید باشد [۱۰]. بطوری که نتایج تحقیق حاضر نیز بیانگر این موضوع بود. محدودیت پژوهش حاضر این بود که از آنجایی که اطلاعات جمع‌آوری شده از روی پرونده بیماران بود، لذا آگاهی کافی از صحت و سقمه آن

^۱ Yavuzcan

References

- 1- Ghulmiyyah L, Sibai B. Maternal mortality from preeclampsia/eclampsia. Semin Perinatol. 2012 Feb;36(1):56-9.
- 2- Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. The Lancet. 2010 Aug;376(9741):631-644.
- 3- Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Hypertensive disorders in pregnancy. Williams Obstetrics, 23rd ed. New York: McGraw-Hill, 2001: 571-572.
- 4- Hutcheon JA, Lisonkova S, Joseph KS. Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2011 Aug;25(4):391-403.
- 5- Duckitt K, Harrington D. Risk factors for pre-eclampsia at antenatal booking: systematic review of controlled studies. BMJ. 2005 Mar;330(7491):565-572.

- 6- Lyall F, Belfort M. Pre-eclampsia: etiology and clinical practice, 1st ed. New York: Cambridge University Press, 2007:251-256.
- 7- Tuffnell DJ, Jankowicz D, Lindow SW, Lyons G, Mason GC, Russell IF, et al. Outcomes of severe pre-eclampsia/eclampsia in Yorkshire 1999/2003. *BJOG*. 2005 Jul;112(7):875-880.
- 8- Buchbinder A, Sibai BM, Caritis S, Macpherson C, Hauth J, Lindheimer MD, et al. Adverse perinatal outcomes are significantly higher in severe gestational hypertension than in mild preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol*. 2002 Jan;186(1):66-71.
- 9- Serin S, Avcı F, Ercan O, Köstü B, Bakacak M, Kiran H. Is neutrophil/lymphocyte ratio a useful marker to predict the severity of pre-eclampsia? *Pregnancy Hypertens*. 2016 Jan;6(1):22-5.
- 10- Kurtoglu E, Kokcu A, Celik H, Tosun M, Malatyalioglu E. May ratio of neutrophil to lymphocyte be useful in predicting the risk of developing preeclampsia? A pilot study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2015 Jan;28(1):97-9.
- 11- Kirbas A, Ersoy AO, Daglar K, Dikici T, Biberoglu EH, Kirbas O, et al. Prediction of preeclampsia by first trimester combined test and simple complete blood count parameters. *J Clin Diagn Res*. 2015 Nov;9(11):QC20-3.
- 12- Toptas M, Asik H, Kalyoncuoglu M, Can E, Can MM. Are Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyte Ratio Predictors for Severity of Preeclampsia? *J Clin Gynecol Obstet*. 2016;5(1):27-31.
- 13- Yavuzcan A, Ca lar M, Ustün Y, Dilbaz S, Ozdemir I, Yildiz E, et al. Mean platelet volume, neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in severe preeclampsia. *Ginekol Pol*. 2014 Mar;85(3):197-203.
- 14- Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap III LC, Hauth JC, Wenstrom KD. Williams obstetrics, 21st ed. New York: Mc Graw-Hill, 2001: 568-569.
- 15- Brabin BJ. Epidemiology of infection in pregnancy. *Rev Infect Dis*. 1985 Sep-Oct;7(5):579-603.
- 16- Cunningham FG, Leveno KJ, Hankins GD, Whalley PJ. Respiratory insufficiency associated with pyelonephritis during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 1984 Jan;63(1):121-5.
- 17- Walsh SW. Maternal-placental interactions of oxidative stress and antioxidants in preeclampsia. *Semin Reprod Endocrinol*. 1998;16(1):93-104.
- 18- Walsh SW, Wang Y. Secretion of lipid peroxides by the human placenta. *Am. J. Obstet- Gynecol*. 1993;169 (6): 1462-1466.
- 19- Vaughan JE, Walsh SW. Neutrophils from pregnant women produce thromboxane and tumor necrosis factor-alpha in response to linoleic acid and oxidative stress. *Am J Obstet Gynecol*. 2005 Sep;193(3 Pt 1):830-5.
- 20- Vaughan JE, Walsh SW, Ford GD. Thromboxane mediates neutrophil superoxide production in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2006 Nov;195(5):1415-20.
- 21- Bachawat T, Washington S, Walsh SW. Neutrophil expression of cyclooxygenase 2 in preeclampsia. *Reprod Sci*. 2010 May;17(5):465-70.
- 22- Madsen YXU, Bouterse SA, Romero R, Hassan S, Mittal P, Elfline M, et al. Leukocyte pyruvate kinase expression is reduced in normal human pregnancy but not in pre-eclampsia. *Am J Reprod Immunol*. 2010 Aug 1;64(2):137-51.
- 23- Leik CE, Walsh SW. Neutrophils infiltrate resistance-sized vessels of subcutaneous fat in women with preeclampsia. *Hypertension*. 2004 Jul;44(1):72-7.
- 24- Shah TJ, Walsh SW. Activation of NF-kappaB and expression of COX-2 in association with neutrophil infiltration in systemic vascular tissue of women with preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol*. 2007 Jan;196(1):48. e1-8.
- 25- Oylumlu M, Ozler A, Yildiz A, Acet H, Polat N, Soydinc HE, et al. New inflammatory markers in pre-eclampsia: echocardiographic epicardial fat thickness and neutrophil to lymphocyte ratio. *Clin Exp Hypertens*. 2014;36(7):503-7.
- 26- Cadden KA, Walsh SW. Neutrophils, but not lymphocytes or monocytes, infiltrate maternal systemic vasculature in women with preeclampsia. *Hypertens Pregnancy*. 2008;27(4):396-405.
- 27- Lurie S, Frenkel E, Tuvbin Y. Comparison of the differential distribution of leukocytes in preeclampsia versus uncomplicated pregnancy. *Gynecol Obstet Invest*. 1998;45(4):229-31.

- 28- Hayashi M, Ohkura T, Inaba N. Elevation of serum macrophage colonystimulating factor before the clinical manifestations of preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol.* 2003 Nov;189(5):1356-60.
- 29- Canzoneri BJ, Lewis DF, Groome L, Wang Y. Increased neutrophil numbers account for leukocytosis in women with preeclampsia. *Am J Perinatol.* 2009 Nov;26(10):729-32.