

جداسازی سلول‌های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی و بررسی فاکتورهای سلول بنیادی آن در شرایط آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران

دکتر ملیحه نوبخت^۱، دکتر باقر پورحیدر^۲، دکتر محمد قاسم
گلمحمدی^۳

^۱ دانشیار گروه بافت شناسی، محقق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
تهران، تهران، ایران

^۲ نویسنده مسئول؛ استادیار گروه علوم تشریعی و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
E-mail: n.najafzade@arums.ac.ir

^۳ استادیار گروه علوم تشریعی، دانشکده پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ^۴ استادیار گروه علوم تشریعی و پاتولوژی، دانشکده
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در طی دوران زندگی، فولیکول موهای بدن وارد سه فاز رشد آناژن، کاتاژن، تلوژن می‌شوند. سلول‌های بنیادی فولیکول مو در ناحیه Bulge که بخشی از غلاف ریشه خارجی است قرار دارند و سلول‌های ناحیه Bulge در فاز آناژن تکثیر می‌کنند و سلول‌های جدیدی ایجاد می‌کنند. چندین سال است که ناحیه Bulge منبع سلول‌های بنیادی محسوب می‌شود، با اینحال مطالعات کمی در مورد خصوصیات سلول‌های بنیادی مشتق از ناحیه Bulge فولیکول مو در موش صحرایی بصورت In Vitro انجام شده است. در این مطالعه، بیان فاکتورهای سلول‌های بنیادی را در ناحیه Bulge فولیکول موی موش‌های صحرایی را بررسی نمودیم.

روش کار: در این مطالعه از فولیکول های موی موش صحرایی، ناحیه Bulge جدا شدند و در محیط کشت حاوی فاکتورهای رشد کشت داده شدند. در سلول‌های ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی یک هفتۀ و سه هفتۀ بعد از کشت، بیان Nestin و K15 بررسی شدند. در این مطالعه از روشهای ایمونوستیوژنیکی و فلورسیتومتری استفاده شد.

یافته‌ها: نتیجه این مطالعه نشان داد که سلول‌ها پتانسیل تکثیری بالایی دارند و قبل از تمایز مارکرهای CD34، Nestin را بیان کردند ولی مارکر K15 در سلول‌های بنیادی که تمایز نشده بودند، بیان نشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که سلول‌های کشت یافته ناحیه Bulge فولیکول های موی موش صحرایی، می‌توانند فاکتورهای سلول‌های بنیادی را بیان کنند پس بنابراین این سلول‌ها می‌توانند سلول‌های بنیادی چند توان باشند.

کلمات کلیدی: Nestin، K15، CD34، Bulge، فولیکول مو، موش صحرایی

دریافت: ۸۹/۸/۱۹ پذیرش: ۹۰/۱/۸

پوست بزرگترین ارگان بدن است که اعمال مهمی در بدن انجام می‌دهد که شامل تنظیم درجه حرارت، حفظ تعادل مایعات بدن می‌باشد. پوست دارای ضمایم باقی همچون اپیدرم، فولیکول مو و غدد سپاسه می‌باشد [۲].

مقدمه

در طی دوران زندگی، بسیاری از ارگان‌ها در بدن، بعد از اینکه سلول‌های آنها بطور فیزیولوژیکی و یا در اثر آسیب از بین می‌روند توانایی ایجاد سلول جدید را دارند، اساساً توانایی ترمیم سلولی به سلول‌های بنیادی بالغ وابسته است [۱].

لطفاً به این مقاله به شکل زیر ارجاع دهید:

Nobakht M, Najafzadeh N, Pourheydar B, Golmohammadi MG. Isolation of Rat Hair Follicle Stem Cells and in Vitro Study of Stem Cell Factors. J Ardabil Univ Med Sci. 2011; 11(2): 176-185. (Full text in persain)

در این مطالعه ۲ گروه مورد بررسی قرار می گیرند: گروه اول: سلول های بنیادی Bulge فولیکول های موش صحرایی پس از جداسازی و با روش ایمونو سیتو شیمی رنگ آمیزی شدند.

گروه دوم: فیبروبلاست های از نوع 3T3 feeder انسنتیتو پاستور تهیه شد و بعنوان گروه کنترل منفی در رنگ آمیزی ایمونو سیتو شیمی در نظر گرفته شد.

جدا کردن ناحیه Bulge فولیکول مو

موش ها در ظرف استوانه ای قرار گرفته و با انداختن پنبه آغشته به انتر^۲ به داخل ظرف بی بوش می شدند. سپس صورت و سر حیوان توسط محلول ۱:۱ بتادین و پراکسید هیدروژن به مدت سه دقیقه شستشو داده شد و بدنبال آن موهای ناحیه صورت حیوان با ریش تراش، برداشته شده و با الكل ۷۰٪ تمیز و ضد عفونی می شد و در نهایت بافت لب بالای موش که حاوی سبیل بود بریده می شد.

بعد از برداشتن بافت لب بالا در زیر هود و محیط استریل، نمونه ها در DMEM/F12 حاوی پنی سیلین (۱۰۰ واحد در میلی لیتر)، استرپتومایسین (۰.۵٪ میکرو گرم در میلی لیتر)، آمفو تریسین B (۰.۵٪ میکرو گرم در میلی لیتر) بمدت نیم ساعت قرار داده می شدند. پس از شستشو نمونه ها در فسفات بافر، بافت های همبند اطراف فولیکول برداشته می شد. سپس نمونه ها به تکه های کوچک تقسیم و در محلول کلائز II / دیسپاز II (۱ میلی گرم در میلی لیتر) و در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد بمدت نیم ساعت انکوبه شدند.

بعد از نیم ساعت فولیکول های مو به وسیله پنس طریف از بافت لب بیرون کشیده شدند و به پلیت های 35mm منتقل شدند و با استفاده از تیغ پیستوری کوچک برش عرضی از بالا و پایین ناحیه Bulge داده شد و ناحیه Bulge جدا شد بعد از برداشتن کپسول کلائز اطراف ناحیه Bulge. این

در سالهای گذشته، محققان وجود سلول های بنیادی را در فولیکول مو گزارش کردند. این سلول های Bulge بنیادی در یک ناحیه خاصی از فولیکول مو بنام قرار گرفته است. این ناحیه نزدیک اتصال عضله راست کننده مو و در زیر غده سباسه قرار گرفته است. سلول های Bulge خاصیت سلول های بنیادی اپیتلیال را دارند و سیکل تقسیم کننده دارند و می توانند بمدت طولانی در فولیکول مو باقی بمانند [۴,۳].

تحقیقات کوبایاشی^۱ و همکارانش نشان داد که سلول های Bulge فولیکول موی موش صحرایی بعد از کشت قادرند ۹۵٪ از کل کلونی های سلولی را تشکیل دهند [۴,۵]. مطالعات نشان داده اند که سلول های Bulge nestin و CD34 در ناحیه فولیکول بیان کننده موش سوری و انسان قرار دارند و این موی موش سوری و انسان مطرح هستند [۶,۷]. تاکنون مطالعه روی بیان این مارکرها در ناحیه فولیکول موی موش صحرایی انجام نشده است.

هدف از این مطالعه بررسی بیان مارکرهای سلول های بنیادی همچون Nestin و CD34 و مارکر سلول های متمایز شده کراتینو سیتی K15 در ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی است.

روش کار

در این مطالعه از موش های صحرایی نژاد ویستار نر به وزن ۲۰۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات در قفس های استاندارد تگهداری می شدند. اتاق تگهداری دارای نور و حرارت کافی بود. شرایط نوری حیوانات به صورت ۱۲ ساعت روشنابی و ۱۲ ساعت تاریکی بود. درجه حرارت اتاق در محدوده ۳۷ درجه سانتی گراد حفظ می شد. آب و غذای کافی برای حیوانات به صورت آزاد وجود داشت.

² Ether

¹ Kobayashi

آنتی بادی پلی کلونال CD34 (Sigma, 1:50)، آنتی بادی مونو کلونال نستین^۴ (Sigma, 1:200) و آنتی بادی مونو کلونال K15 (Sigma, 1:100) استفاده شد^۵. PBS و سپس سلول ها سه بار بمدت ۱۵ دقیقه با^۶ PBS شستشو داده شدند. آنتی بادی ثانویه با رقت های زیر بمدت دو ساعت در دمای اتاق استفاده شد: از آنتی بادی های ثانویه کونژو که با FITC با رقت ۱:۲۰۰ و آنتی بادی ثانویه کونژو که با Alexa flour ۱:۴۰۰ با رقت ۱:۵۴۶ بمدت دو ساعت در دمای اتاق استفاده شد. بعد از سه بار شستشو با PBS نمونه ها با میکروسکوپ فلوئورسنت (Olympus AX70) مورد بررسی قرار گرفتند.

فلوسایتومتری

سوسپانسیون سلول های ناحیه Bulge فولیکول مو، پس از فیکس شدن در فرمالدئید ۰/۲٪ و PBS در بافر حاوی ساپونین ۰/۰٪ و سدیم آزاد ۰/۰۵٪ قرار داده شدند. سپس سلولها با آنتی بادی پلی کلونال اولیه CD34 (Sigma, 1:50)، آنتی بادی مونو کلونال نستین و آنتی بادی مونو کلونال K15 رنگ شدند و پس از شستشو با بافر فسفات، با آنتی بادی ثانویه کونژو که و شستشو با بافر فسفات، با آنتی بادی ثانویه رنگ شدند به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند.

یافته ها

از روش تعديل شده ای برای جداسازی راحت ناحیه Bulge استفاده شد که فولیکول موی سبیل موش و ناحیه Bulge در شکل ۱ مشاهده می شود.

بخش با بافر فسفات شستشو داده شد و آماده کشت گردید.

کشت سلولی

سلول های فیبروبلاست ۳T3 feeder از انستیتو پاستور تهیه شد و در محیط (gibco)^۱ حاوی ۱۰٪ FBS^۲ کشت داده شدند.

کشت سلول های ناحیه Bulge طی مراحلی انجام گرفت [۹.۸].

ناحیه Bulge جدا شده در محلول ۰/۰۱٪ اتیل دی آمین تترا اسیتیک اسید (EDTA) و ۰/۰۱٪ تریپسین (gibco)^۳ به مدت ۳۰ دقیقه و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه شد. سلول های جدا شده با سرعت ۱۲۰۰ rpm بمدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شدند و بعد از جداسازی، سلول ها در پلیت هایی که قبلا با کلائز نوع یک پوشیده شده بودند ریخته شدند.

سلول ها در محیط DMEM/F12 حاوی ال-گلوتامین ۰/۳ میلی مول)، آدنین (۰/۱۳۵ میلی مول)، انسولین (۰/۵ میکرو گرم در میلی لیتر)، کلراتوکسین (سیگما ۰/۱)، هیدروکورتیزون (۰/۵ میلی گرم در میلی لیتر)، فاکتور رشد اپیدرمال (EGF)^۴ (۰/۱۰ نانو گرم در میلی لیتر، سیگما) و ۱۰٪ FBS^۵ کشت داده شدند.

ایمونو سیتوشیمی

سلول ها با ۴٪ پارافرما آلدئید بمدت ۱ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد فیکس شدند سپس بمدت ۱۵ دقیقه و سه بار با فسفات بافر شستشو داده شدند. نمونه ها بمدت نیم ساعت در محلول حاوی ۰/۱۰٪ سرم بز (Fluka) X-100 (invitrogen)، ۰/۳ تریتون (invitrogen) قرار داده شدند.

آنتی بادی های اولیه در غلظت های زیر بمدت یک شبانه روز در دمای ۴°C نگهداری شدند:

⁴ Nestin

⁵ Phosphate Buffer Solution


⁶ Fluorescein Isothiocyanate

¹ Dulbecco's Modified Eagle Medium

² Fetal Bovine Serum

³ Epidermal Growth Factor

رنگ آمیزی های ایمونوپیتوشیمی نشان داد که سلول های Bulge که از کشت فولیکول موی موش صحرایی بوجود می آیند قبل از تمایز شدن، را بیان می کنند (شکل A.۳) در حالیکه همین سلول ها



تکثیر سلولی

مقایسه تصاویر شکل ۲ نشان می دهد که سلول های ناحیه Bulge از میزان رشد بالایی برخوردار بودند.





شکل ۱. جداسازی ناحیه Bulge از فولیکول موی سیبل موش صحرایی. فولیکول موی جداشده همراه با بافت همبند اطراف (A) و ناحیه Bulge با فلاش نشان داده شده است (B).


بعد از دو ماه کشت دادن و پاساز دادن (شکل B.۳) مشابه نمونه فیبروبلاست ها (شکل C.۳ و D) قادر به بیان nestin نیستند. سلول های bulge در روش فلوسیتوometری هم، مارکر nestin را قبل از تمایز بیان می کردند (شکل ۴).

همانطوریکه مشاهده می شود سلول ها در محیط کشت حاوی EGF, Cholera toxin تکثیر زیادی دارند. در پلیت هایی که میزان کمی سلول وجود دارد، بعد از یک هفته کشت سلولی، پلیت ها از سلول های بنیادی پر شده بود.


بیان nestin در سلول های Bulge



شکل ۲. کشت سلول های بنیادی Bulge. سلول های بنیادی ناحیه Bulge بعد از تراکم سلولی کم کشت داده شدند (A). همان سلول های بعد از ۲۴ ساعت (B) و ۴۸ ساعت (C) و یک ماه (D) بعد از کشت دیده می شوند.



شکل ۳. سلولهای Bulge، هفت روز بعد از کشت اولیه، nestin positive شده اند(A). بعد از دو ماه سلولهای متمایز شده (B) و فیبروبلاست های nestin با مار کر (C) 3t3 رنگ نگرفته اند و شکل (D) سلولهای فیبروبلاست رنگ آمیزی شده با DAPI را نشان می دهد.




شکل ۴. بیان نستین در روش فلوسیتومتری. جمعیت سلولی بر روی محورهای FSC و SSC دیده می شود. پس از گیت بندی و اعمال آن بر روی FL1 و هر یک از چهار قسمت، میزان nestin مثبت معادل ۹۴,۳۲ M1 هم بر روی میزان ۶۵,۳۵ M2 هم بر روی هیستوگرام باشد.


ایمونوپرتوژنیکی و فلوسیتومتری یک هفته بعد از کشت را نشان می دهد.

بیان مارکر CD34 در سلولهای Bulge

شکل های ۵ و ۶ بیان مارکر سلولهای بنیادی CD34 را در سلولهای ناحیه Bulge در دو روش



شکل ۵. بیان آنتی ژن CD34 با روش ایمونوستیتوژیمی. (A)، عدم بیان CD34 در گروه کنترل منفی فیبروبلاست 3T3 feeder را نشان می دهد در حالیکه در سلول های bulge یک هفته بعد از کشت این پروتئین بیان می شود (B) (200 x).




شکل ۶. بیان CD34 در روش فلوسیتومتری. جمعیت سلولی بر روی محورهای FSC و SSC دیده می شود، پس از گیت بندی و اعمال آن بر روی FL1 و هر یک از چهار قسمت، میزان CD34 مثبت معادل ۹۲.۸۹ می باشد. میزان M2 CD34 هم بر روی هیستوگرام ۹۲.۶۵ می باشد.


بحث

برای مطالعه سلول های بنیادی فولیکول مو، از فولیکول های سیلی موش صحرایی بیشتر استفاده می شود به لحاظ اینکه به راحتی قابل دسترسی و به اندازه کافی بزرگ است. مطالعات محققان روی ناحیه bulge فولیکول موی انسان و موش نشان داده

بیان نشدن مارکر کراتینوسیت K15 در ناحیه bulge شکل های ۷ و ۸ عدم بیان مارکر K15 را یک هفته بعد از کشت در سلول های ناحیه bulge نشان می دهد.



شکل ۷. عدم بیان مارکر کراتینوسیت با رنگ آمیزی ایمونوسبیتوژیمی. K15 در سلولهای فیبروبلاست ۳T3 feeder (A) و سلولهای bulge یک هفته بعد از کشت بیان نمی شود (B)(100x).



شکل ۸. عدم بیان K15 در روش فلوسیتومتری. جمعیت سلولی بر روی محورهای FSC و SSC دیده می شود، پس از گیت بندی و اعمال آن بر روی FL1 و هر یک از چهار قسمت، میزان K15 مثبت معادل ۳.۷۳٪ می باشد میزان M1 هم بر روی هیستوگرام ۹۲.۲۶٪ می باشد، که منفی در نظر گرفته می شود.

سلولهای این ناحیه، ۹۵٪ کلونی‌ها را تشکیل می‌دهد [۱۰.۵]. همچنین یکی از نتایج این مطالعه، بیان nestin در سلولهایی بود که یک هفتک کشت داده بودند اما بعد از تمایز شدن بیان نمی‌شدند، این نتیجه نشان می‌دهد که سلولهای بیان‌کننده nestin نه تنها در ناحیه Bulge فولیکول موی انسان و موش‌های ترنسژنیک قرار دارد [۱۲.۱۱] بلکه این سلول‌ها در ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی نیز قرار دارد.

است که سلولهای بنیادی در داخل ناحیه Bulge قرار دارد [۴]. ناحیه Bulge نزدیک محل اتصال عضله راست کننده و زیر غده چربی قرار دارد [۴,۳]. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سلولهای Bulge موش صحرایی را می‌توان جدا کرد و در محیط کشت حاوی فاکتورهای رشد کشت داد. آنالیز کلونی‌های تشکیل شده و تعداد سلول‌ها در این مطالعه نشان داد که پتانسیل تکثیری سلولهای Bulge زیاد است. مطالعات قبلی روی سبیل موش صحرایی نشان داده است که در محیط کشت،

داده اند که اغلب نقاط غلاف ریشه ای خارجی فولیکول توان بیان K15 را دارند اما ناحیه کوچکی در غلاف ریشه ای خارجی که حاوی سلول های بنیادی است قدرت بیان K15 را ندارند [۱۸].

بررسی روی نمونه های حیوانی نشان داده است که مارکرهای مختلفی در فولیکول موی موش سوری، موش صحرایی و انسان بیان می شود [۱۹]. ما در مطالعات قبلی هم نشان داده بودیم که سلول های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی توان تبدیل به سلول های نورونی و گلیال را دارد [۲۱.۲۰].

نتیجه گیری

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که سلول های Bulge فولیکول موی موش صحرایی می توانند مارکرهای سلول های بنیادی همچون nestin و CD34 را بیان کنند و پروتئین تمایزی سلول های کراتینوسیت در سلول های این ناحیه وجود ندارد. پس سلول های این ناحیه قدرت تکثیری زیادی دارند و می توانند بعنوان منبع سلول های بنیادی بالغین در فولیکول مو مطرح شوند و در آینده می توانند اهمیت درمانی داشته باشند.

یکی از نتایج مطالعه حاضر، بیان CD34 در سلول های ناحیه Bulge بود که موید نتیجه، تحقیقات پابلت و همکارانش روی فولیکول موی انسان است که نشان دادند که در غلاف ریشه ای خارجی و در ناحیه Bulge CD34 بیان می شود و همچنین بیان این آنتیژن سلول پروژنیتور نشان دهنده وجود سلول های بنیادی در ناحیه Bulge است [۱۴،۱۳]. سلول های ناحیه Bulge در موش های ترنسژنیک nestin و CD34 را بیان می کنند [۱۶،۱۵،۷.۶].

بررسی ما با روش ایمونو هیستوشیمی نشان داد که سلول های Bulge فولیکول موی موش صحرایی قبل از تمایز، مارکر K15 را بیان نمی کنند که موید نتیجه مطالعات آموح و همکارانش روی موش های ترنسژنیک است که نشان دادند، سلول های بنیادی فولیکول مو جدا شده از ناحیه Bulge در حالت متمایز نشده، کراتین ۱۵ را بیان نمی کردند اما CD34 را بیان می کردند و سلول های ناحیه Bulge در محیط کشت حاوی FBS ۱۰٪ RPMI1640 و ۱۰٪ FBS متمایز می شوند و به سلول عصبی، سلول گلیال، کراتینوسیت، عضله صاف و ملانوسیت تبدیل می شوند. بطوریکه ۴۸٪ این سلول های بنیادی سپیل و ۶۸٪ سلول های بنیادی فولیکول های موی خزه ای پوست به نورون تبدیل می شود [۱۷]. مطالعات محققان دیگر روی فولیکول موی گوسفند نشان

References

- 1- Preston SL, Alison MR, Forbes SJ, Direkze NC, Poulsom R, Wright NA. The new stem cell biology: something for everyone. Mol Pathol. 2003 Apr;56(2):86-96.
- 2- Barthel R, Aberdam D. Epidermal stem cells. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Jul;19(4):405-13.
- 3- Paus R, Cotsarelis G. The biology of hair follicles. N Engl J Med. 1999 Aug;341(7):491-7.
- 4- Cotsarelis G, Sun T, Lavker R. Label-retaining cells reside in the bulge area of pilosebaceous unit: implications for follicular stem cells, hair cycle, and skin carcinogenesis. Cell. 1990 Jun;61(7):1329-37.
- 5- Claudinot S, Nicolas M, Oshima H, Rochat A, Barrandon Y. Long-term renewal of hair follicles from clonogenic multipotent stem cells. Proc Natl Acad Sci USA. 2005 Oct;102(41):14677.
- 6- Li L, Mignone J, Yang M, Matic M, Penman S, Enikolopov G, et al. Nestin expression in hair follicle sheath progenitor cells. Proc Natl Acad Sci USA. 2003 Aug;100(17):9958.

- 7- Amoh, Y, Li L, Campillo R, Kawahara K, Katsuoka K, Penman, et al. Implanted hair follicle stem cells form Schwann cells that support repair of severed peripheral nerves. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2005 Dec; 102(49):17734-38.
- 8- Yang J, Lavker R, Sun T. Upper human hair follicle contains a subpopulation of keratinocytes with superior in vitro proliferative potential. *J Invest Dermatol*. 1993 Nov;101(5):652-9.
- 9- Sieber-Blum M, Grim M. The adult hair follicle: cradle for pluripotent neural crest stem cells. *Birth Defects Res C Embryo Today*. 2004 Jun;72(2):162-72.
- 10- Kobayashi K, Rochat A, Barrandon Y. Segregation of keratinocyte colony-forming cells in the bulge of the rat vibrissa. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1993 Aug; 90(15):7391.
- 11- Hu Y, Zhang Z, Sieber-Blum M. An epidermal neural crest stem cell (EPI-NCSC) molecular signature. *Stem Cells*. 2006 Dec;24(12):2692-702.
- 12- Sieber-Blum M, Grim M. The adult hair follicle: cradle for pluripotent neural crest stem cells. *Birth Defects Res C: Embryo Today*. 2004 Jun;72(2):162-72.
- 13- Poblet E, Jimenez-Acosta F, Rocamora A. QBEND/10 (anti-CD34 antibody) in external root sheath cells and follicular tumors. *J Cutan Pathol*. 1994 Jun;21(3):224-28.
- 14- Pascucci L, Mercati F, Gargiulo AM, Pedini V, Sorbolini S, Ceccarelli P. CD34 glycoprotein identifies putative stem cells located in the isthmic region of canine hair follicles. *Vet Dermatol*. 2006 Aug;17(4):244-51.
- 15- Hoang M, Keady M, Mahalingam M. Stem cell markers (cytokeratin 15, CD34 and nestin) in primary scarring and non-scarring alopecia. *Br J Dermatol*. 2009 Mar;160(3):609-15.
- 16- Trempus CS, Morris RJ, Bortner CD, Cotsarelis G, Faircloth RS, Reece JM, et al. Enrichment for living murine keratinocytes from the hair follicle bulge with the cell surface marker CD34. *J Invest Dermatol*. 2003 Apr;120(4):501-11.
- 17- Amoh Y, Li L, Katsuoka K, Penman S, Hoffman RM. Multipotent nestin-positive, keratin-negative hair-follicle bulge stem cells can form neurons. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2005 Apr; 102(15): 5530-4.
- 18- Whitbread LA, Powell BC. Expression of the intermediate filament keratin gene, K15, in the basal cell layers of epithelia and the hair follicle. *Exp Cell Res*. 1998 Nov; 244(2):448-59.
- 19- Inoue K, Aoi N, Sato T, Yamauchi Y, Suga H, Eto H, et al. Differential expression of stem-cell-associated markers in human hair follicle epithelial cells. *Lab Invest*. 2009 Aug;89(8):844-56.
- 20- Nobakht M, Najafzadeh N, Safari M ,Roshandel N, Delaviz H, Joghataie M, et al. Bulge cells of rat hair follicles: Isolation, cultivation, morphological and biological features. *The Cell*. 2010 Spring; 12(1): 51-8.
- 21- Asalghoo S, Noubakht M, Rahbar Roushandel N, Mousavizadeh K, Najafzadeh N, Kordestani S. Neurotrophic effects of silibinin on differentiation of hair follicle stem cells to neurons. *Qom Med Sci J*. 2010 Winter; 3(4): 12-19.

Isolation of Rat Hair Follicle Stem Cells and in Vitro Study of Stem Cell Factors in Iran

Nobakht M, PhD¹; Najafzadeh N, PhD²; Pourheydar B, PhD³; Golmohammadi MG, PhD⁴

¹ Associate Prof. of Dept. of Histology & Neurosciences, Researcher in cellular & Molecular Research Center, Antimicrobial Resistance Research center, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Corresponding Author: Assistant Prof. of Dept. of Anatomy, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran. E-mail: n.najafzade@arums.ac.ir

³ Assistant Prof. of Dept. of Anatomy, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

⁴ Assistant Prof. of Dept. of Anatomy, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.

ABSTRACT

Background & objectives: During lifetime, hair follicles undergo three cyclic changes: anagen, catagen, telogen. In hair follicles, stem cells located in Bulge area, which is part of the outer root sheath. Bulge cells proliferate new cells in anagen phase. Bulge region of hair follicle indicated as a source of stem cell for many years, but little studies done in vitro to characterize rat bulge region hair follicle stem cells.

Methods: In this study Bulge cells of rat hair follicle were isolated and cultured, then morphological features of these cells surveyed. Nestin and CD34 as hair follicle stem cell markers, and K15 as a keratinocyte marker assessed by immunocytochemistry after one to three weeks.

Results: In this study, we found that, 2 days after attachment of cells to floor of plates, the cells were initiated to proliferation and migration. These cells had good nestin and CD34 immunostaining, but after three week differentiation, were nestin and CD34 negative. Also these cells couldn't express K15.

Conclusion: Results showed that cultivated rat bulge cells, have high proliferative potential, and also could express nestin and CD34 as stem cell factors.

Key words: Nestin, CD34; K15; Bulge Region; Hair Follicle; Rat