

بررسی تجربه حسی بیماران بسته در بخش مراقبت های ویژه مراکز

آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال ۱۳۸۱

دکتر جواد آقازاده^۱، مژگان لطفی^۲

E-mail: Jaghazadeh56@yahoo.ca

^۱ نویسنده مسئول: استادیار گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

^۲ مریم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

زمینه و هدف: درک (دریافت) و ادراک (احساس) دو جزء هر تجربه حسی هستند. دریافت حسی (sensory reception) جریان اطلاعات در بازه محیط داخلی یا خارجی از راه حسی است. انسان ها از طریق دریافت و سازمان بندی تحریکات حسی، خود را از محیط پیرامون آگاه می سازند این ادراک و سازمان بندی تحریکات، ادراک حسی نامیده می شود. هنگامی که مددجویی در یک موسسه مراقبت بهداشتی پذیرفته می شود با محرك هایی که از نظر کمیت و کیفیت نسبت به محرك های آموخته شده قبلی متفاوتند روبرو می شود و همین امر منجر به ایجاد تغییرات حسی در روی می گردد. بیماری که در بخش ICU بسته می شود از یک سو به دلیل شرایط بحرانی و از سوی دیگر به علت اقدامات درمانی پیچیده ای که روی او صورت می گیرد، در معرض گرانیاری و با محرومیت حسی است. این مطالعه با هدف تعیین تجربه حسی بیماران بسته در ICU انجام گرفت.

روش کار: این بررسی یک مطالعه توصیفی است. حجم نمونه ۴۵ نفر و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفت. جنبه گردآوری داده ها از پرسشنامه های مشتمل بر ۳ بخش استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که واحد های مورد پژوهش در بیش از ۸۰٪ موارد به هیچ وجه، خیلی کم و یا فقط در بعضی موارد دریافت حسی ناخواهایند را تجربه کرده بودند (افق گرانیاری حسی). اما بررسی واکنش های عاطفی نشان داد که ۸/۳۹٪ درد، ۱۲٪ اضطراب، ۴/۷٪ ترس، ۴/۰٪ خشم و عصبانیت و ۰/۹٪ احساس نفرت را تجربه کرده بودند که به نظر می رسد احتمالاً به دلیل محرومیت حسی ناشی از کمیود ملاقات با خانواده و کمبود آگاهی در مورد بیماری باشد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر بیماران در ICU واکنش های عاطفی ناخواهایند متعددی را تجربه می کنند. جهت به حداقل رساندن این تجربه آموزش به بیمار و افزایش زمان ملاقات پیشنهاد می گردد.

واژه های کلیدی: تجربه حسی، بیماران مراقبت های ویژه، گرانیاری حسی، محرومیت حسی

پذیرش: ۱۱/۲/۸۵

دریافت: ۱۵/۴/۸۴

تغییرات رفتاری از قبیل توهمات شنوایی، بینایی، نگرانی

مقدمه

و اضطراب در روی بروز می کند [۱]. انسان یک سیستم باز و در تعامل دائم با محیط است. عامل اصلی ارتباط این سیستم با محیط، سیستم حسی است [۱]. دو جزء هر تجربه حسی، درک (دریافت) و ادراک (احساس) هستند. دریافت حسی^۱

از گذشته ای دور روانشناسان و معلم ان به اهمیت ادراک های حسی پی برده بودند ولی اهمیت آن در زمینه های بهداشتی و پرستاری تقریباً در دو یا سه دهه اخیر آشکار شده است. محققین معتقدند در صورت محرومیت انسان از تحریکات و یا دریافت بیش از حد تحریک، تعادل جسمی یا روانی وی از دست می رود و

^۱ - Sensory reception

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال ۱۳۸۱ انجام گرفت.

روش کار

این بررسی یک مطالعه توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت از پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش: بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک و وضعیت بالینی بیمار - بخش دوم شامل ۶ سوال بسته جبهت تعیین دریافت‌های حسی بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی، لمس و محدوده قلمرو و قسمت آخر شامل ۶ سوال باز به منظور بررسی واکنش‌های عاطفی بیماران از قبیل اضطراب، ترس، غم، درد، عصبانیت، آرامش و نفرت و گناه، بود.

جامعه پژوهش کلیه بیماران بستری در بخش‌های ویژه مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود و نمونه‌های پژوهش براساس نمونه‌گیری آسان و با توجه به مشخصات واحدهای مورد پژوهش: عدم وجود سابقه بستری در بیمارستان وضعیت Post ICU، تمایل به شرکت در پژوهش و بالاخره ^۲GCS بالاتر از ۱۳ در زمان مصاحبه، انجام گرفت.

نمونه‌گیری در طی ۴ ماه صورت گرفت و از کل بیماران بستری در این بخش‌ها در طی این مدت فقط ۴ نفر حائز شرایط و معیار ورود به مطالعه بودند، لذا با توجه به محدودیت زمانی ۴۵ نمونه انتخاب شدند. جبهت توصیف داده‌ها از آمار توصیفی استفاده گردید.

یافته‌ها

۴۵ بیمار از بخش‌های مختلف ICU تحت بررسی قرار گرفتند. ۱۹ مورد ICU قلب (۴۲٪)، ۱ مورد ICU داخلی (۲٪)، ۲ مورد ICU ریه (۴٪)، ۸ مورد ICU مغز (۱۷٪) و ۱۵ مورد ICU جراحی (۳۳٪). از ۴۵ نمونه مورد بررسی بیشترین گروه سنی در رده سنی ۴۷-۵۶ سال قرار داشتند. (جدول ۱)

جريان اطلاعات در باره محیط داخلی یا خارجی از راه حسی است.

انسان‌ها از طریق دریافت و سازمان‌بندی تحریکات حسی، خود را از محیط پیرامون آگاه می‌سازند، این ادارک و سازمان‌بندی تحریکات به طور کلی ادراک حسی نامیده می‌شود. هنگامی که مددجویی در یک موسسه مراقبت بیداشتی پذیرفته می‌شود، مواجهه با حرکت‌های آموخته شده قبلی متفاوتند باعث تغییراتی در وی می‌گردد. درک بیمار از این تغییرات حسی تا حدودی به عوامل زمینه‌ای خود او بستگی دارد. در واقع سطح تحمل در برابر حرکت‌های حسی محدوده منحصر به فردی است که با کلیت فرد در همه زمینه‌های جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط می‌باشد .[۲]

بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شود از یک سو به دلیل شرایط بحرانی و از سوی دیگر به علت اقدامات درمانی پیچیده‌ای که روی او صورت می‌گیرد، در معرض گرانباری و یا محرومیت حسی است .[۲].

از آنجا که این بیماران به دلیل داشتن لوله تراشه قادر به برقراری ارتباط مناسب و بیان نیازهای خود نیستند، درک این موضوع که چه اندیشه‌های ذهن بیمار را در گیر ساخته است و یا اینکه در این وضعیت چه دریافت‌های حسی ناخواشایندی دارد، باعث می‌شود تا پرستار تعامل انسانی و ارتباط درمانی بهتری با این بیماران برقرار نماید.

شناخت تجارب حسی بیماران بستری در آی. سی. یو به پرستار کمک خواهد کرد که با تعديل استرسورهای حسی، بیمار را در شرایط تعادل حسی^۱ تحت مراقبت قرار داده و طبعاً بدین وسیله نقش موثری در روند بهبودی بیمار ایفا نماید.

به همین منظور مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی تجارب حسی بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (قلب، داخلی، ریه، مغز و جراحی) بیمارستانهای

² Glasco Coma Scale

^۱ - Sensory balance

۱۰ مورد شناوری (٪.۶/۷) بود. از نظر سطح هوشیاری در زمان بستری اغلب بیماران ۱۹ مورد (٪.۴۳/۳) دارای سطح هوشیاری $GCS = ۱۱-۱۳$ بودند (جدول ۴).

مدت اتصال بیماران به دستگاه تهییه مکانیکی ۲۰ ساعت (٪.۳۵/۵) بود که البته ۲۱ نفر (٪.۴۶/۷) اصلًا به دستگاه اتصال پیدا نکرده بودند (جدول ۴).

جدول ۴. مدت زمان اتصال بیماران به دستگاه تهییه مکانیکی

درصد	تعداد	مدت اتصال به MCV
۴۶/۷	۲۱	عدم اتصال
۶/۷	۳	کمتر از ۱۰ ساعت
۳۵/۵	۱۶	۱۰ - ۲۰
۶/۷	۳	۳۱ - ۴۱
.	.	۴۲ - ۴۲
۲/۲	۱	۴۳ - ۵۳
.	.	۵۴ - ۶۴
۲/۲	۱	۶۵ - ۷۵
۱۰۰	۴۵	جمع

همچنین ۲۹ نفر بیماران (٪.۶۴/۵) بین ۱-۳ روز در

ICU بستری بودند (جدول ۵)

جدول ۵. مدت زمان اقامت بیماران در ICU

درصد	تعداد	مدت بستری در ICU
۶۴/۵	۲۹	۱ - ۳ (روز)
۲۶/۷	۱۲	۴ - ۶ (روز)
۴/۴	۲	۷ - ۹ (روز)
۲/۲	۱	۱۰ - ۱۲ (روز)
۲/۲	۱	۱۳ - ۱۵ (روز)
۱۰۰	۴۵	جمع

بحث

نتایج حاصل نشان داد که بیشترین سابقه اختلال حسی (۱۱ مورد) مربوط به بینایی و بیشترین اختلال حسی فعلی (۷ مورد) نیز مربوط به بینایی بود.

با توجه به این که اغلب واحدهای مورد پژوهش در گروه های سنی ۴۷-۵۶ و ۵۷-۶۶ سال قرار داشتند این مورد غیر طبیعی به نظر نمی رسد. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نمونه های مورد پژوهش در زمینه حس چشایی (٪.۱۱/۲)، بوبایی (٪.۱/۱)، بینایی

جدول ۱. توزیع گروه سنی

درصد	تعداد	توزیع گروه سنی
۶/۷	۳	۷ - ۱۶
۱۳/۳	۶	۱۷ - ۲۶
۱۱/۱	۵	۲۷ - ۳۶
۱۵/۵	۷	۳۷ - ۴۶
۲۴/۵	۱۱	۴۷ - ۵۶
۲۰	۹	۵۷ - ۶۶
۸/۹	۴	۶۷ - ۷۶

همچنین اغلب نمونه ها ۳۵ مورد (٪.۷۷/۸) بیسواند یا دارای سطح سواد خواندن و نوشتن بودند. (جدول ۲)

جدول ۲. فراوانی میزان تحصیلات

درصد	تعداد	توزیع گروه سنی
۳۷/۸	۱۷	بیسواند
۴۰	۱۸	ابتدایی
۱۳/۴	۶	راهنمایی
۴/۴	۲	دبیرستان
۲/۲	۱	فوق دبیلم
۲/۲	۱	لیسانس
۱۰۰	۴۵	جمع

از نظر جنسیت ۲۶ مورد (٪.۵۷/۸۸) مذکور و ۱۹ مورد (٪.۴۲/۲) موئنث بودند. ۳۷ مورد (٪.۸۲/۲) متاهل و ۸ مورد (٪.۱۷/۸) مجرد بودند. همچنین اغلب مردان کشاورز (٪.۱۵/۵) و بیشتر زنان (٪.۳۷/۸) خانه دار بودند.

جدول ۳. شغل افراد

درصد	تعداد	شغل افراد
۱۱/۲	۵	آزاد
۱۷/۸	۸	کارگر
۸/۹	۴	کارمند
۱۵/۵	۷	کشاورز
۲/۲	۱	محصل
۲/۲	۱	بازنشسته
۴/۴	۲	بیکار
۳۷/۸	۱۷	خانه دار
۱۰۰	۴۵	جمع

اطلاعات به دست آمده در مورد وضعیت بالینی بیماران مورد مطالعه نشان داد: ۱۵ نفر از بیماران دارای سابقه قبلی اختلال حسی بودند که ۱۱ مورد بینایی (٪.۷۳/۳)، ۱ مورد چشایی (٪.۶/۷)، ۲ مورد بوبایی

ترس از پیامد بیماری، ترس از خفگی به علت انسداد لوله تراشه، محیط ICU، مشاهده بیماران بد حال، احساس تنهایی، تهدید کلامی بعضی از پرستاران مهمترین علل مطرح شده در ترس بودند که بیشترین علت ذکر شده مربوط به ترس از پیامد بیماری (۴ مورد - ۷/۳۰٪)، ترس از خفگی به علت انسداد لوله تراشه و محیط ICU هر کدام ۳ مورد (۳/۲۳٪) بود. در مورد علت غم و اندوه بیماران به مواردی چون مشاهده زجر و ناراحتی سایر بیماران، دلتنگی برای خانواده، تمرکز روی این فکر "چرا بیمار شده‌ام؟" پیامد بیماری و هزینه‌های درمانی اشاره داشتند که مهمترین علت یاد شده، مشاهده زجر و ناراحتی سایر بیماران و دلتنگی برای خانواده (هر کدام ۳ مورد ۳/۳٪) بود.

بالاخره عواملی که منجر به احساس خشم و عصبانیت در بیماران شده بود عبارت بودند از تاخیر پرستاران در رسیدگی به موقع، سهیل‌انگاری پرستاران و رفتار خشن پرستاران که از بین آنها مهمترین علت اشاره شده تاخیر در رسیدگی به موقع پرستاران (۴ مورد، ۵/۷٪) بود.

چراغی ۱۳۸۱ به نقل از هال می‌نویسد: عدم توجه به زیر ساخت‌های روانی - اجتماعی مددجو و حریم شخصی و پنداشتی او موجب احساس تهاجم به قلمرو و بروز واکنش‌های هیجانی از جمله گرانباری حسی خواهد شد و زمینه برگز تحریک‌پذیری مددجو و حالت‌هایی از قبیل خشونت و عصبانیت، زجر روحی - روانی و اضطراب و هذیان که همگی از نمودهای گرانباری حسی هستند را مساعد می‌سازد [۸].

های ویژه می‌نویسد: این بیماران به اطلاعاتی در مراحل حین و بعد از بستری در بخش‌های ویژه نیاز دارند و پرستاران باید به طور مداوم این افراد را در خصوص تجارب قبلی و فعلی‌شان در بخش‌های ویژه آگاه سازند [۹].

(۱۴/۱٪)، شنوازی (۷/۳٪) و لامسه و قلمرو انسانی (۵/۸٪) دریافت‌های حسی ناخوشایندی را در حد زیاد و خیلی زیاد تجربه کرده‌اند. بیشترین دریافت حسی ناخوشایند مربوط به حس چشایی و بینایی بود که بیشترین علت طعم بد دهان به دلیل لوله تراشه (۳/۸٪) و مشاهده اقدامات مراقبتی - درمانی از بیماران بد حال و مشرف به مرگ ۲۲/۲٪ و ترس از وسائل و دستگاه‌های ICU (۶/۲۶٪) ذکر شده بود.

میسینروی^۱، نشان داد که استرس، تکنولوژی و سر و صدا از محرك‌های مضري هستند که منجر به عوارض جدی و طولانی شدن زمان بستری می‌گردد [۴/۵]. در خصوص واکنش‌های عاطفی و علل مربوط به آن یافته‌ها نشان داد که بیماران ۲۰ مورد اضطراب (۱۳/۱۸٪)، ۱۳ مورد ترس (۳/۱۳٪) و ۸ مورد خشم و عصبانیت (۴/۷٪) و بالاخره ۹ مورد احساس غم و اندوه (۳/۸٪) را تجربه کرده‌اند. از علل اضطراب، نگرانی برای خانواده و از پیامدهای بیماری، هزینه درمان، وجود لوله تراشه، انتظار عمل، پروسیجرهای جراحی، درد زیاد و عدم آگاهی اشاره شده بود که مهمترین عامل اضطراب از بین عالیم فوق به ترتیب مربوط به نگرانی از پیامد بیماری (۷ مورد - ۳/۵٪) و نگرانی برای خانواده (۵ مورد - ۲/۵٪) بود. مطالعه‌ای که روی تجارب عاطفی بیماران تحت عمل جراحی چشم انجام شده است نیز نشان داده است که این بیماران تجارب حسی عاطفی چون اضطراب (۵/۶۰٪)، ترس (۵/۴۷٪)، درد (۵/۴٪) بی-حسی در قسمتی از بدن (۵/۳۲٪)، گیجی (۵/۳٪)، عدم آرامش (۵/۲۷٪)، نفرت (۵/۱۰٪)، احساس گناه (۵/۵٪)، احساس یک بو یا طعم غیر طبیعی (۵/۷٪) و خشم و عصبانیت (۵/۷٪) را تجربه کرده‌اند [۶] که به نظر می‌رسد تجارب حسی ناخوشایند در بیماران تحت عمل جراحی چشم در شرایط قبل، حین و بعد از عمل نسبت به این مطالعه بیشتر بوده است. یافته‌های حاصل از سایر تحقیقات نشان داده است که مهمترین نشانه‌های اضطراب تغییرات قابل اندازه‌گیری روان شناختی و رفتاری قابل مشاهده است [۷].

² Hupcey

¹ Mcinroy

با خانواده و دریافت‌های حسی مطلوب (بینایی و لامسه) از جانب آنها و نیز کمبود آگاهی در مورد پیامد بیماری، تجهیزات بخش ICU و بعضی از پروسیجرهای درمانی چون درن، لوله‌تراسه، چست تیوب و غیره داشت. لذا با توجه به نتایج به دست آمده اجرای موارد زیر در بخش‌های مورد پژوهش پیشنهاد می‌گردد:

- ۱- افزایش مدت زمان ملاقات (جهت افزایش دریافت‌های حسی خوشایند)
- ۲- جلب مشارکت خانواده برای انجام بعضی از مراقبت‌ها (تغییر پوزیشن، بهداشت - تغذیه و غیره)
- ۳- تشویق خانواده برای لمس بیمار و صحبت با وی در مورد موضوعات مورد علاقه بیمار جهت افزایش تحریکات حسی مطلوب (۳) (بدون توجه به سطح هوشیاری بیمار)
- ۴- آموزش بیماران، توسط پرستاران در مورد تجهیزات، وسائل، پروسیجرهای درمانی و بویژه افزایش آگاهی آنها در مورد فرآیند بیماری جهت کاهش ترس و اضطراب ناشی از عدم آگاهی.

همچنین تحقیقات اشاره می‌کنند که باید نیازهای آموزشی بیمار به طور مداوم بررسی و آموزش‌های لازم براساس آن صورت گیرد [۱۰]. مطالعات بیان کننده این است، اگر چه تشخیص و درمان اختلالات روانی در بخش‌های ویژه مدت زیادی است که مورد غفلت قرار گرفته است با این وجود امروزه این اختلالات بهتر مورد تشخیص و درمان قرار می‌گیرد [۱۱].

زمانی که بیمار از درد، اضطراب و با سایر موارد ذکر شده در رنج است پرستار نقش مهمی در کنار آمدن وی با ترسیابی دارد [۱۲].

نتیجه‌گیری

اگر چه واحدهای پژوهش در بیش از ۸۰ درصد موارد به هیچ وجه، خیلی کم و یا فقط در بعضی از موارد دریافت حسی ناخوشایند را تجربه کرده بودند (فاقد گرانباری حسی)، با این وجود واکنشهای عاطفی چون اضطراب، ترس، غم و اندوه را می‌توان به محرومیت حسی ناشی از عدم و یا کمبود زمان ملاقات

منابع

- ۱- معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه‌های پرستاری، چاپ اول، تهران، مرکز نشر آمار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸؛ صفحه ۲۵.
- ۲- شیلاک آدام، سوآزن، پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه. ترجمه، هادی کوشیار، داریوش مغزی. چاپ اول، انتشارات: شهرآب، سال ۱۳۷۹، صفحات ۲۰ تا ۲۲.
- ۳- تایلور، اصول پرستاری تایلور (مفاهیم پرستاری). ترجمه گروه مترجمین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چاپ اول، تهران، نشر و تبلیغ بشری، سال ۱۳۷۵، صفحه ۴۷۸.
- 4- Mcinoroy A, Ed wards S. Preventing sensory alteration: a practical approach. Nurse Crit care. 2002 Sep-Oct; 7(5): 247-54.
- ۵- امینی رویا. بزرگ سیدرضا. نقش پرستار در پیشگیری از محرومیت و گرانباری حسی در بیماران پس از عمل جراحی قلب باز. اولین همایش سراسری محرومیت و گرانباری حسی دع پ تبریز ۱۳۸۱، صفحه ۱۰.
- ۶- لطفی مژگان، آقازاده احمد، کرمی ناهید. بررسی تجارت حسی بیماران تحت عمل جراحی چشم در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی همدان. ۱۳۸۳. سمینار پرستاری اتاق عمل تهران ۱۳۸۳، صفحه ۱۰۰.
- 7- Frazier SK, Moser DK, Riegel B, McKinley S, Blakely W, Kim KA and et al. Critical care nurses assessment of patients anxiety reliance on physiological and behavioral parameters. A M J of Crit care. 2002 Jan; 11(1): 57-64.

- ۸- چراغی محمدعلی. داستان تهاجم به قلمرو و گرانباری حسی از پذیرش تا ترجیح یا پس از مرگ. اولین همایش سراسری محرومیت و گرانباری حسی. دع پ تبریز، ۱۳۸۱، صفحه ۱۷.
- 9- Hupcey JE, Zimmerman HE. The need to know: experiences of critically ill patients. Am J crit care 2000 May; 9(3): 192-8.
- 10- Bahruth AJ. What every patient should know. pretransplantation and post transplantation. Crit Care Nurs Q. 2004 Jan-Mar; 27(1): 31-60.
- 11- Ampelas JF, Pochard F, Consoli SM .Psychiatric disorders in intensive care units. Encephal 2002 May-Jan; 28(3pt1): 191-9.
- 12- Miller R. Dimension of Critical care Nursing. Nursing 2004 Jan-Mar; 22(1): 31.