

## **Hypolipidemic Effects of Aloe-Vera Gel Extract on Adult Male Rats under High-Fat Diet**

Yazdani N<sup>1</sup>, Hosseini SE<sup>1\*</sup>

1. Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

\* **Corresponding author.** Tel: +989171183917, Fax: +987143311172, E-mail: ebrahim.hossini@yahoo.com

received: Apr 19, 2017      accepted: Sep 21, 2017

### **ABSTRACT**

**Background & objective:** Aloe-vera is an herb that has long been used in traditional medicine. Using high-fat diet and fatty liver disorder cause obesity and hyperlipidemia. So, this study aimed to investigate the effects of Aloe - vera gel extract on the body weight and lipid profile in adult male rats treated with high-fat diet.

**Methods:** In this experimental study, 40 adult male rats were included in the control group (no treatment), sham group (treated with high-fat diet 10 ml/kg) and three experimental groups receiving high-fat diet (10ml/kg) along with 150, 300 and 600 mg/kg Aloe- vera gel extracts. Prescriptions were conducted by gavage, for 60 days. At the end, after anesthetizing the rats and phlebotomizing their heart, the serum levels of cholesterol, triglycerides, LDL and HDL were measured. The obtained results were analyzed by ANOVA and Duncan tests.

**Results:** The results showed that high-fat diet significantly increased the serum levels of cholesterol, triglycerides, LDL ( $p<0.001$ ) and weight gain ( $p<0.01$ ) but had no significant effect on the serum level of HDL. However, in the groups receiving Aloe -vera gel and high-fat diet, there was a significant decrease in the weight and serum levels of cholesterol, triglyceride ( $p<0.05$ ) and LDL ( $p<0.01$ ).

**Conclusion:** High-fat diets increase the weight and serums levels of triglycerides, LDL and cholesterol. Also, the Aloe- vera gel extract causes weight loss and improves lipid profiles in the rats treated with Aloe -vera gel extract.

**Keywords:** Aloe-Vera Gel; Weight Loss; Lipid Profiles; High-Fat Diets; Rat.

# بررسی اثر هیپولیپیدیمیک عصاره هیدرالکلی ژل آلوئهورا در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت رژیم غذایی پر چرب

نوشین یزدانی<sup>۱</sup>، سیدابراهیم حسینی<sup>\*</sup>

۱. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران  
ebrahim.hossini@yahoo.com \*نویسنده مسئول. تلفن: ۰۹۱۷۱۸۳۹۱۷۲ فaks: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۷۲

## چکیده

**زمینه و هدف:** آلوئه ورا گیاهی است که از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از رژیم غذایی پر چرب و اختلال کبد چرب، باعث شیوع اختلال چاقی و هیپولیپیدمی می‌شوند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره ژل آلوئه ورا بر وزن بدن و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی نر بالغ تحت تیمار با رژیم غذایی پر چرب انجام گرفت.

**روش کار:** در این مطالعه تجربی از ۴ سر موش صحرایی نر بالغ در گروههای شاهد (تیمار با رژیم پر چرب ۱۰ ml/kg) و ۳ دسته تجربی دریافت کننده رژیم غذایی پر چرب (۱۰ ml/kg) به همراه دوزهای ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ عصاره ژل آلوئهورا استفاده گردید. تجویزها ۶۰ روزه و به صورت گاواز انجام شد. در پایان پس از بیهوده نمودن حیوانات با خونگیری از قلب آنها اقدام به اندازه گیری میزان سرمی کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و HDL گردید و نتایج توسط آزمون‌های تحلیل واریانس یکطرفه و دانکن مورد آنالیز قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** نتایج این بررسی نشان داد رژیم غذایی پر چرب باعث افزایش معنادار وزن و در میزان سرمی، کلسترول، تری گلیسیرید، LDL (۰/۰۱< $p$ ) و افزایش وزن (۰/۰۱< $p$ ) می‌شود و در میزان سرمی HDL تاثیر معناداری ندارد. در حالی که در گروههای دریافت کننده ژل آلوئه ورا با رژیم پر چرب کاهش معنادار وزن و میزان سرمی کلسترول، تری گلیسیرید (۰/۰۱< $p$ ) و LDL (۰/۰۵< $p$ ) مشاهده گردید.

**نتیجه گیری:** رژیم‌های غذایی پر چرب باعث افزایش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و LDL می‌شود و عصاره ژل آلوئه ورا باعث کاهش وزن و بهبود شاخص‌های لیپیدی در موش‌های تحت تیمار با عصاره ژل آلوئه ورا می‌شود.

**واژه‌های کلیدی:** ژل آلوئه ورا، وزن، چربی خون، رژیم پر چرب، موش صحرایی

دريافت: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

پذيرش: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

## مقدمه

پرکالری و با پر چرب ایجاد می‌شود و منجر به استئاتوز کبدی و آسیب به آن می‌گردد [۲]. بیماری کبد چرب غیرالکلی طیف وسیعی از بیماری‌های کبدی از استئاتوزیس ساده تا استئوھپاتیت غیرالکلی را که در نتیجه تجمع ذرات چربی در سلول‌های کبدی ایجاد می‌شود و می‌تواند منجر به فیروزیس، سیروزیس و حتی سرطان سلول‌های کبدی شود [۳]. بیماری کبد چرب غیرالکلی به عنوان شرایطی تعریف می‌شود که محتوای چربی کبد، تعیین شده بوسیله هیستولوژی،

کبد بزرگترین غده بدن و بعد از پوست بزرگترین اندام است که به عنوان اولین مکان برای فرایند جذب بیشتر مواد غذایی و دارویی و تشکیل اسیدهای صفراءوی که نقش اصلی را در جذب چربی به عهده دارد، عمل می‌کند [۱]. کبد چرب غیرالکلی یکی از اختلالات شایع کبد در سراسر جهان بوده که معمولاً با چاقی مفرط، هیپولیپیدمی و دیابت ملیتوس نوع ۲ همراه می‌باشد که در نتیجه تغذیه با جیره غذایی

قرن‌ها است به خاطر اثرات ضد التهابی، ضد میکروبی، التیام زخم، تحریک کننده سیستم ایمنی، ضد توموروی، ضد ورم مغاسل، ضد روماتوئید، ضد سرطان، پائین آوردن قند خون و برای درمان یبوست، اختلالات گوارشی، نقص سیستم ایمنی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۰، ۹]. در ترکیب شیمایی آلوئه‌ورا موادی مانند گلیکوپروتئین، آنتراکینون، ساکارید، گلوکوماناس، گالاكتوز و اسید گالاكتورونیک، آلوئین، آلوئه-امودین، باربالوئین، ایزوباربالوئی، آلوئسین، بتاپیتوسترونول، دی‌اتیل هگزیل فتالیت، ویتامین‌های B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, B<sub>1</sub>, A, C و بتاکاروتون یافت می‌شود [۱۱]. آلوئه-امودین به عنوان یک ترکیب مهم آنتی اکسیدان در جاروب کردن رادیکال‌های آزاد نقش کلیدی دارد [۱۲]. آلوئه‌ورا می‌تواند یک منبع بالقوه از ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی باشد [۱۳]. این گیاه موثر بر جذب روده‌ای، دارای اثر ضد دیابت و اثر آنتی اکسیدانی و همچنین فعالیت ضد هیپرلیپیدمی است [۱۰]. با عنایت به افزایش شیوع چاقی در اکثر کشورهای جهان و ارتباط آن با بروز کبد چرب غیرالکلی می‌توان چاقی را یک مشکل بهداشتی در حال افزایش در بسیاری از نقاط دنیا به حساب آورد. با توجه به آنکه اکثر داروهایی که در درمان این اختلال مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای اثرات جانبی بر بدن می‌باشند، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدرولالکلی آلوئه‌ورا بر میزان چربی‌های سرم خون در موش‌های صحرایی نر بالغ انجام گردید.

### روش کار

این مطالعه از نوع تجربی است که در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. تعداد ۴ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، در محدوده وزنی ۲۱۰-۲۱۰ گرم و سن ۱۱۰-۱۰۰ روز استفاده گردید. حیوانات مورد بررسی در این مطالعه از مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

بیشتر از ۵ درصد باشد [۴]. دو حالت از بیماری کبد چرب غیرالکلی وجود دارد: استئاتوز ساده که نشان‌دهنده فقط رسوب چربی در هپاتوسیت‌ها است و استئوھپاتیت غیرالکلی که علاوه بر استئاتوز نشان‌دهنده واکنش غیرالتهابی نکروزی نیز می‌باشد [۵]. کبد چرب غیرالکلی با تجمع تری گلیسریدها در هپاتوسیت‌ها که در اثر استریفیکاسیون اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول شکل می‌گیرند، مشخص می‌شود. افزایش اسیدهای چرب آزاد در کبد از سه منبع جداگانه یعنی لیپولیز، رژیم غذایی پر چرب و لیپوژنر مجدد سرچشم می‌گیرد [۶]. اختلالاتی نظیر مقاومت به انسولین، اجزای سندروم متابولیک (چاقی و دیس لیپیدمی) و استرس اکسیداسیو در ایجاد بیماری کبد چرب موثر می‌باشند [۷]. با عنایت به دلایل بیماری کبد چرب غیرالکلی یک رژیم غذایی با ترکیبات قندی پایین برای درمان این اختلال مناسب است اگرچه کاهش وزن سریع به وسیله محدودیت زیاد کالری پیشنهاد نمی‌شود زیرا ممکن است باعث اختلال در متابولیسم و التهاب و فیبروز کبدی شود [۵]. مقاومت به انسولین یک نقش اساسی در پاتوژنر بیماری کبد چرب غیرالکلی بازی می‌کند و داروهایی نظیر تیازولیدین دیون‌ها مانند پیوگلیتازون و روزیگلیتازون به عنوان آگونیست‌های رسپتور PPAR- $\gamma$ <sup>۱</sup> باعث بهبودی در مقاومت به انسولین در بافت چربی، کبد و بافت عضلانی می‌شوند. این داروهای موجب معکوس‌شدن فرآیندهای هیپرانسولینمی، هیپر تری گلیسیریدیما و سطوح بالای اسیدهای چرب آزاد پلاسما می‌شوند که با بیماری کبد چرب غیرالکلی مرتبط هستند [۸]. نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو نقش اساسی در پاتوژنر کبد چرب غیرالکلی بازی می‌کند، بنابراین کاربرد آنتی اکسیدان‌هایی مانند ویتامین E در درمان کبد چرب غیرالکلی می‌تواند موثر باشد [۵]. آلوئه‌ورا یا صبر زرد طبی با نام علمی *Aloe barabadiensis*

<sup>۱</sup> Peroxisome Proliferator Activated Receptor  $\gamma$

تیمار با رژیم غذایی پرچرب) و ۳ دسته تجربی تقسیم شدند. حیوانات گروه‌های تجربی نیز علاوه بر رژیم غذایی معمولی که به صورت نامحدود در اختیار آنان قرار داشت، به ترتیب تحت تیمار با رژیم غذایی ۶۰ mg/kg، ۳۰۰ mg/kg، ۱۵۰ mg/kg و ۰۰۰ mg/kg عصاره هیدرو الکلی آلوئه‌ورا قرار گرفتند. در این بررسی کلیه تجویزها به صورت گاواز و برای مدت ۶۰ روز انجام گردید [۱۴-۱۶]. سپس در پایان دوره آزمایش بعد از تعیین وزن حیوانات در گروه‌های مختلف و پس از بیبوش نمودن موش‌ها به وسیله اتر اقدام به خون گیری از قلب آنها گردید و پس از تهیه سرم از نمونه‌های خونی با استفاده از کیت‌های ساخت شرکت هیومن آلمان اقدام به اندازه گیری میزان سرمی تری گلیسرید و کلسترول تام، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) گردید. در پایان پس از تأیید نرمال بودن توزیع داده‌ها از طریق آزمون کالموگروف- اسمیرنوف<sup>۱</sup> نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA و دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و اختلاف داده‌ها در سطح  $0.05 \leq p \leq 0.01$  معنادار در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش معنادار وزن بدن نسبت به گروه کنترل می‌گردد ( $0.01 \leq p \leq 0.001$ ). در حالی که در حیوانات تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب به همراه عصاره آلوئه‌ورا وزن بدن حیوانات نسب به حیوانات تحت تیمار با رژیم مشاهده گردید ( $0.01 \leq p \leq 0.01$ ). همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که در میزان سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL در حیوانات تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل مشاهده می‌گردد ( $0.001 \leq p \leq 0.01$ ).

<sup>۱</sup> Kolmogorov-Smirnov

علوم پزشکی شیراز تهیه گردیدند. در مطالعه حاضر در طول دوره آزمایش، همه حیوانات از آب و غذای فشرده ساخت شرکت خوراک دام پارس تهران و بدون محدودیت برخوردار بودند و در یک اتاق مخصوص در دمای  $20 \pm 2$  درجه سلسیوس و در شرایط ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی نگه داری شدند. پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد حمایت از حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخلاق دانشگاه تحت شماره IR.miau13951016 به تصویب رسید.

در این مطالعه برای تهیه عصاره هیدرو الکلی ژل آلوئه‌ورا ابتدا تعدادی از برگ‌های تازه آلوئه‌ورا تهیه گردید. سپس برگ‌ها را شسته و ژل آن را خارج نموده و سپس ژل به دست آمده در آثانول ۹۵ درصد به میزان چهار برابر حجم قرار داده شد. ظرف حاوی ژل به مدت ۴ روز بر روی شیکر قرار داده شد سپس توسط فیلتر صاف شد و با استفاده از دستگاه Rotary Evaporator در دمای ۴۵ درجه تغليظ گردید و در دمای ۴۰ درجه کاملاً خشک و به صورت پودر درآمد. هم چنین در این بررسی برای تیمار با رژیم غذایی پرچرب از پروتکل گاواز امولسیون پرچرب استفاده گردید. بر اساس این پروتکل، حیوانات علاوه بر رژیم غذایی معمولی که بدون هیچ محدودیتی در اختیار آنان قرار می‌گرفت، به مدت ۶۰ روز نیز تحت گاواز روزانه ۲ میلی لیتر امولسیون پرچرب قرار گرفتند. با توجه به مطالعات پروتکل امولسیون پرچرب برای موش‌های صحرابی شامل سدیم دی اکسی کولات (۱۰ gr)، کلسترول (۱۰۰ gr)، پودر کامل شیر (۸۰ gr)، کربوهیدرات (۲۰۰ gr)، روغن ذرت (۴۰۰ gr)، ساکاروز (۱۵۰ gr)، تیوئین ۸۰ (۳۶/۴ gr)، پروپیلن گلیکول (۸۰ gr)، مولتی ویتامین (۲/۵ gr)، نمک (۱۰ gr)، مواد معدنی مخلوط (۱/۵ gr) و آب مقطر (۰۰۳ میلی لیتر) می‌باشد [۱۴، ۱۵]. در پژوهش حاضر حیوانات به ۵ گروه ۸ تایی شامل گروه‌های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (تحت

تیمار با رژیم غذایی پرچرب تنها، کاهش معناداری نشان داده شد ( $P \leq 0.01$ ). به علاوه نتایج این بررسی نشان داد که رژیم غذایی پرچرب به تنها یعنی همراه با عصاره آلوئهورا تاثیر معناداری بر میزان سرمی HDL ندارند (جدول ۱).

در حالی که در حیوانات تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب به همراه عصاره آلوئهورا در میزان سرمی کلسترول تام، تری گلیسیرید و LDL در حالی که نسبت به حیوانات گروه کنترل افزایش معناداری مشاهده گردید ( $P \leq 0.01$ ، اما نسبت به حیوانات تحت

جدول ۱. نتایج مربوط به وزن بدن و غلظت تری گلیسیرید، کلسترول، LDL و HDL در گروه‌های مختلف (میانگین  $\pm$  انحراف معیار)

HDL mg/dl	LDL mg/dl	mg/dl تام کلسترول	تری گلیسیرید mg/dl	وزن بدن gr	گروه
۱۳۷/۰۰ $\pm$ ۱/۳۷	۴/۸۳ $\pm$ ۰/۶۵	۴۸/۱۷ $\pm$ ۱/۷۸	۴۹/۴ $\pm$ ۱/۸۱	۳۳۴/۸ $\pm$ ۲۳/۶۱	کنترل
۱۴۷/۴۰ $\pm$ ۱۶/۲۲	** ۲۰/۳۳ $\pm$ ۲/۵۰	** ۷۷/۲۹ $\pm$ ۵/۸۲	** ۷۶/۸۰ $\pm$ ۶/۴۵	۴۱۲/۶ $\pm$ ۱۴/۹۰*	شاهد (رژیم غذایی پرچرب + سرم فیزیولوژیک)
۱۴۲/۰۰ $\pm$ ۵/۹۰	### ۱۱/۸۸ $\pm$ ۱/۱۷	# ۵۸/۸۸ $\pm$ ۳/۴۲	# ۶۲/۱۴ $\pm$ ۲/۱۲	۳۵۷/۴ $\pm$ ۱۱/۳۴#	تجربی ۱ (رژیم غذایی پرچرب + عصاره آلوورا (۱۵۰ mg/kg)
۱۴۰/۰۰ $\pm$ ۶/۶۰	۱۰/۵۰ $\pm$ ۰/۸۰ ###	# ۶۰/۰۰ $\pm$ ۱/۵۶	# ۶۰/۱۳ $\pm$ ۲/۴۵	۳۵۴/۳ $\pm$ ۷/۷۸#	تجربی ۲ (رژیم غذایی پرچرب + عصاره آلوورا (۳۰۰ mg/kg)
۱۲۴/۸۹ $\pm$ ۷/۹۴	## ۹/۳۳ $\pm$ ۰/۹۴	# ۵۷/۴۴ $\pm$ ۳/۱۲	# ۵۶/۱۷ $\pm$ ۰/۶۰	۳۵۱/۳ $\pm$ ۷/۵۱#	تجربی ۳ (رژیم غذایی پرچرب + عصاره آلوورا (۴۰۰ mg/kg)

# نشان‌دهنده اختلاف معنادار در سطح  $P \leq 0.05$  نسبت به گروه شاهد## نشان‌دهنده اختلاف معنادار در سطح  $P \leq 0.01$  نسبت به گروه شاهد\* نشان‌دهنده اختلاف معنادار در سطح  $P \leq 0.05$  نسبت به سایر گروه‌ها\*\* نشان‌دهنده اختلاف معنادار در سطح  $P \leq 0.01$  نسبت به گروه کنترل\\$ نشان‌دهنده اختلاف معنادار در سطح  $P \leq 0.01$  نسبت به گروه کنترل

دیگر از مواد موجود در عصاره ژل آلوئهورا Acemannan است که مسئول بسیاری از خواص مغاید منصوب به این گیاه از قبیل کاهش قند خون، فشار خون و بیبود پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی می‌باشد [۱۶، ۲۰]. همچنین این ترکیب باعث می‌شود تا باکتری‌های روده ای مانع جذب مواد قندی از روده شوند [۲۱-۲۳]. لذا احتمالاً در پژوهش حاضر نیز کاهش وزن و بیبود پروفایل لیپیدی در گروه‌های تحت تیمار با عصاره ژل آلوئهورا را می‌توان به اثرات هیپولیپیدیمیک این گیاه و همچنین به اثرات آن در جلوگیری از جذب ترکیبات قندی نسبت داد. تحقیقات نشان داده است که تغذیه با جیره پرچرب و فست فودی منجر به استئاتوز کبد می‌گردد [۲۴، ۲۵]. تری گلیسیریدها و کلسترول، لیپیدهای بیولوژیک مهمی هستند که دریافت بیش از حد آنها از طریق جیره غذایی منجر به هیپرتری گلیسیریدمی و

## بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش وزن بدن و همچنین افزایش میزان سرمی تری گلیسیرید، کلسترول و LDL می‌شود و بر میزان سرمی HDL فاقد تاثیر معنادار می‌باشد، در حالی که عصاره ژل آلوئهورا باعث بیبود پروفایل لیپیدی و کاهش وزن حیوانات تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب می‌شود. مطابق با نتایج این بررسی در یک مطالعه دیگر نشان داده شده است که بسیاری از انسان‌ها به دلیل رژیم غذایی پرکالری و پرچرب با معضل اضافه وزن و چاقی روبرو هستند [۱۷]. مشخص شده است که مواد موجود در عصاره ژل آلوئهورا و به ویژه ترکیبات فیتوستروولی با پیشگیری از توسعه رگه‌های چربی و کاهش توسعه آتروواسکلروز و همچنین با کاهش توده چربی احشایی در تنظیم وزن بدن موثرند [۱۸، ۱۹]. به علاوه یکی

ترکیبات موجود در عصاره ژل آلوئهورا با دخالت باکتری‌های روده ای مانع جذب ترکیبات قندی و چربی از روده می‌شود [۲۱،۲۰]، بنابراین احتمالاً در مطالعه حاضر نیز عصاره ژل آلوئهورا با همکاری باکتری‌های روده ای و از طریق کاهش جذب چربی از روده باعث بهبود پروفایل لیپیدی در موش‌های تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب شده است. نتایج یک مطالعه نشان‌دهنده نقش ژل فرآوری شده آلوئهورا در کاهش قند و چربی‌های خون در یک مدل موش دیابتی غیر وابسته به انسولین می‌باشد [۳۰]. با عنایت به محدودیت‌های این تحقیق از جمله در دسترس نبودن امکانات آنالیز و اندازه گیری مواد موثر در ژل آلوئهورا تشخیص مکانیسم‌های اثر ژل این گیاه در بهبود پروفایل لیپیدی موش‌های صحرایی تحت رژیم پرچرب نیاز به انجام تحقیقات بیشتر دارد.

### نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و LDL می‌شود و عصاره ژل آلوئهورا باعث کاهش وزن و بهبود شاخص‌های لیپیدی در موش‌های تحت تیمار با عصاره ژل آلوئهورا می‌شود.

### تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم نوشین یزدانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز می‌باشد که تحت شماره ۱۴۳۵۴۳۶۷۷۹ در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۰ به تصویب رسیده است، لذا نویسنده‌گان مقاله برخود واجب می‌دانند تا از همکاران حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز که در انجام این مطالعه نهایت همکاری را داشتند تقدير و تشکر نمایند.

هیپرکلسترولمی می‌گردد [۲۶]؛ بنابراین در پژوهش حاضر نیز افزایش میزان سرمی تری گلیسیرید و کلسترول در حیوانات دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب را می‌توان به وجود مقادیر بالای از چربی در رژیم غذایی حیوانات نسبت داد. از سوی دیگرهم سو با نتایج این بررسی، مطالعات نشان می‌دهند که در اثر دریافت چربی‌های اشباع غلظت کلسترول و ذرات LDL بالا می‌رود و در نتیجه استئاتوز کبدی ایجاد می‌شود [۲۸،۲۷]. هم سو با نتایج این بررسی نشان داده شده است که ژل آلوئهورا با داشتن ترکیب Acemannan باعث بهبود پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت می‌شود [۱۵،۱۹]. در یک مطالعه نشان داده شد که عصاره گیاه آلوئهورا بر روی بیان برخی از ژن‌ها نظیر ژن گیرنده تکثیر فعال پروواسی زوم (PPAR) در موش‌های مبتلا به کبد چرب دارای اثر تحریکی است و باعث بهبود بیان کمی ژن‌های موثر در سوخت و ساز اسیدهای چرب در کبد می‌گردد [۲۹]؛ بنابراین در مطالعه حاضر نیز احتمالاً عصاره ژل آلوئهورا از طریق اثر بر بیان ژن‌های موثر در متابولیسم اسیدهای چرب باعث بهبود پروفایل لیپیدی در موش‌های تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب شده است. ویتامین E (آلغا توکوفرول) آنتی اکسیدانی است که با حفاظت از اسیدهای چرب غیراشعه از پراکسیداسیون لیپیدی و رادیکال‌های آزاد تولید شده طی این واکنش باعث پایداری غشای سلولی می‌شود و با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی برای مهار پیشرفت اختلال کبد چرب غیر الکلی مفید می‌باشد [۷]. از آنجا که یکی از ترکیبات موجود در عصاره ژل آلوئهورا ویتامین E می‌باشد [۱۱]، لذا احتمالاً در مطالعه حاضر نیز عصاره ژل آلوئهورا از طریق ویتامین E باعث اصلاح پروفایل لیپیدی در حیوانات تحت تیمار با رژیم غذایی پرچرب شده است. مطالعات نشان داده اند که

**References**

- 1-Cui Y, Cheng Y, Guo Y, Xie Y, Yao W, Zhang W, et al. Evaluating the hepatoprotective efficacy of *Aloe vera* polysaccharides against subchronic exposure of aflatoxins B<sub>1</sub>. *J Taiwan Inst Chem Eng*. 2017 Jul;76:10-17.
- 2-Pais R, Giral P, Khan JF, Rosenbaum D, Housset C, Poynard T et al. Fatty liver is an independent predictor of early carotid atherosclerosis. *J Hepatol*. 2016 Jul;65(1):95-102.
- 3-McCullough AJ. The clinical features, diagnosis and natural history of nonalcoholic fatty liver disease. *Clin Liver Dis*. 2004 Aug;8(3):521-533.
- 4-Wilkins T, Tadkod A, Hepburn I, Schade RR. Nonalcoholic fatty liver disease: diagnosis and management. *Amer Fam Phys*. 2013 Jul ;88(1):35-42
- 5-Takahashi Y, Fukusato T. Pediatric nonalcoholic fatty liver disease: Overview with emphasis on histology. *World J Gastroenterol*. 2010 Nov; 16(42): 5280-5.
- 6- Mohajeri D, Rezae A, Mousavi GH. Histopathological study on the effects of Crocin on prevention of fatty liver disease in the rats fed with high fat diet. *Vet Clin Pathol*. 2011;5(3): 1295-1304.[Full text in Persian]
- 7-Duvnjak M, Tomasic V, Gomercic M, Smircic Duvnjak L, Barsic N, Lerotic I. Therapy of nonalcoholic fatty liver disease: current status. *J Physiol Pharmacol*. 2009 Dec;60 Suppl 7:57-66.
- 8-Barshop NJ, Sirlin CB, Schwimmer JB, Lavine JE. Epidemiology, pathogenesis and potential treatments of paediatric non-alcoholic fatty liver disease. *Aliment Pharmacol Ther*. 2008 Jul;28(1):13-24.
- 9-Tanaka M, Misawa E, Ito Y, Habara N, Nomaguchi K, Yamada M, et al. Identification of five phytosterols from *Aloe vera* gel as anti-diabetic compounds. *Biol Pharm Bull*. 2006 Jul;29(7):1418-22.
- 10-Radha MH, Laxmipriya NP. Evaluation of biological properties and clinical effectiveness of *Aloe vera*: A systematic review. *J Tradit Complement Med*. 2014 Dec;5(1):21-6..
- 11-Choi S, Chung MH. A review on the relationship between aloe vera components and their biologic effects. *Semin Integr Medi*.2003;1(1):53-62.
- 12-Furkan M, Alam MT, Rizvi A, Khan K, Ali A, Shamsuzzaman A, et al. Aloe emodin, an anthroquinone from *Aloe vera* acts as an anti aggregatory agent to the thermally aggregated hemoglobin. *Spectrochimica Acta A Mole Biomol Spectrosc* . 2017 May;179:188-193.
- 13-Kumar S, Yadav M, Yadav A, Yadav JP. Impact of spatial and climatic conditions on phytochemical diversity and in vitro antioxidant activity of Indian *Aloe vera* (L.) S Afr J Botany.2017 Jul;111:50-59.
- 14-Zou Y, Li J, Lu C, Wang J, Ge J, Huang Y, et al. High-fat emulsion-induced rat model of nonalcoholic steatohepatitis. *Life Sci*. 2006;79(11):1100-1107.
- 15-Machado MV, Michelotti GA, Xie G, Almeida Pereira T, Boursier J, Bohnic B, et al. Mouse models of diet-induced nonalcoholic steatohepatitis reproduce the heterogeneity of the human disease. *PLoS One*. 2015;10(5):e0127991.
- 16-Choudhary M, Kochhar A, Sangha J. Hypoglycemic and hypolipidemic effect of *Aloe vera* L. in non-insulin dependent diabetics. *J Food Sci Technol*.2014 Jan; 51(1): 90-96.
- 17-Gajda A, Pellizzon M, Ricci M, Ulman E. Diet-induced metabolic syndrome in rodent models. *Anim Lab News*. 2007; 1(2):34-42.
- 18-Huseini HF, Kianbakht S, Hajiaghaei R, Dabaghian FH. Anti-hyperglycemic and anti-hypercholesterolemic effects of *Aloe vera* leaf gel in hyperlipidemic type 2 diabetic patients: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. *Planta Med*. 2012 Mar;78(4):311-316.
- 19-Dana N, Javanmard SH, Asgary S, Asnaashari H, Abdian N. The effect of *Aloe vera* leaf gel on fatty streak formation in hypercholesterolemic rabbits. *J Res Med Sci*. 2012 May;17(5):439-342.
- 20-Pothuraju R, Sharma RK, Onteru SK, Singh S, Hussain SA. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of aloe vera extract preparations: a review. *Phytother Res*. 2016 Feb;30(2):200-207
- 21-Sharma K, Mittal A, Chauhan N. *Aloe Vera* as Penetration Enhancer. *Inte J Drug Devel Res*. 2015 Mar; 7(1):31-43.
- 22-Minjares-Fuentes R, Rodríguez-González VM, González-Laredo RF, Eim V, González-Centeno MR, Femenia A. Effect of different drying procedures on the bioactive polysaccharide acemannan from *Aloe vera* (*Aloe barbadensis* Miller). *Carbohydr Polym*. 2017 Jul 15;168:327-336.

- 23-Chokboribal J, Tachaboonyakiat W, Sangvanich P, Ruangpornvisuti V, Jettanacheawchankit S, Thunyakitpisal P. Deacetylation affects the physical properties and bioactivity of acemannan, an extracted polysaccharide from Aloe vera. *Carbohydr Polym*. 2015 Nov 20;133:556-66.
- 24-Gadupudi GS, Klaren WD, Olivier AK, Klingelhutz AJ, Robertson LW. PCB126-induced disruption in gluconeogenesis and fatty acid oxidation precedes fatty liver in male rats. *Toxicol Sci*. 2016 Jan;149(1):98-110.
- 25-Chung SW, Park H, Kwon J, Choe GY, Kim SH, Oh JH. Effect of hypercholesterolemia on fatty infiltration and quality of tendon-to-bone healing in a rabbit model of a chronic rotator cuff tear: electrophysiological, biomechanical, and histological analyses. *Am J Sports Med*. 2016 May;44(5):1153-64.
- 26-Yeh MM, Belt P, Brunt EM, Kowdley KV, Wilson LA, Ferrell L. Acidophil bodies in nonalcoholic steatohepatitis. *Hum Pathol*. 2016 Jun;52:28-37.
- 27-Rodrigues AH, Moreira CC, Mario ÉG, de Souza Cordeiro LM, Avelar GF, Boton LM, et al. Differential modulation of cytosolic lipases activities in liver and adipose tissue by high-carbohydrate diets. *Endocrine*. 2016 Aug;53(2):423-432.
- 28-Cave MC, Clair HB, Hardesty JE, Falkner KC, Feng W, Clark BJ, et al. Nuclear receptors and nonalcoholic fatty liver disease. *Biochim Biophys Acta*. 2016 Sep;1859(9):1083-99.
- 29-Nomaguchi K, Tanaka M, Misawa E, Yamada M, Toidaa T, Iwatsukia K. Animal models of steatohepatitis. *Semin Liver Dis*. 2011; 21(1):99-104.
- 30-Kim K, Kim H, Kwon J, Lee S, Kong H, Im SA, et al. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of processed Aloe vera gel in a mouse model of non-insulin-dependent diabetes mellitus. *Phytomedicine*. 2009 Sep;16(9):856-563.