

آموزش بر میزان قند خون و درشت مغذی های دریافتی بیماران دیابتی وابسته به انسولین

رها نژادی رارع دکتر مهدوی دیرزا رحیمی

پیش

زمینه و هدف: دیابت یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی جهان و بیماری است که مراقبت های مداوم را می طلبد و به همین جیت لازم است تا بیماران فوق تحت آموزش های خود مراقبتی و تغذیه ای قرار گیرند. این مطالعه به منظور بررسی آموزش تغذیه بر میزان قند خون و درشت مغذی های دریافتی بیماران دیابتی وابسته به انسولین انجام گرفت.

روش کار: بیمار دیابتی زیر سال از مراجعین به مرکز آموزش درمانی علی اصغر اردبیل در سال حاضر به شرکت در کلاس های آموزشی شدند به عنوان نمونه انتخاب و پس از جلب رضایت بیماران باد آمد خوارک و قندخون آن ها قبل و بعد آموزش کنترل و با استفاده از آزمون تی- زوج و نرم افزار SPSS و Food Processor و تحلیل و مقایسه شدند.

: بررسی نشان داد که قند خون قبل و بعد از آموزش تغییر کرد ولی نتایج آماری معنی داری وجود نداشت.
زان درشت مغذی های دریافتی (کربوهیدرات) - پروتئین) قبل و بد از آموزش رابطه معنی دار آماری داشت و پس از آموزش نتایج با مقادیر توصیه ای WHO هم خواهی داشت. زان در سطح HbA_{1c} اکثراً در سطح درصد بود. که نشانگر کنترل بیماری در سطح متوسط می باشد و میزان هیپو گلیسمی در مدت مطالعه از / %

نتیجه گیری: تغییرات چشم گیری در میزان قند خون مشاهده نشد. ولی میزان HbA_{1c} و درشت مغذی های دریافتی نشانگر تاثیر مثبت آموزش های تغذیه ای در این بیماران بود.
واژه های کلیدی: آموزش تغذیه دیابت وابسته به انسولین HbA_{1c}

- مؤلف مسئول: مربی پرستاری دانشکده پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تبران
- استاد یار گروه اطفال دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود، که آموزش تغذیه را بر روی بیمار که حاضر شدند بطور مرتب در کلاس های آموزشی شرکت کنند مورد بررسی قرار داد. کل بیماران دیابتی این مرکز نفر بودند، که برخی به دلیل دوری مسافت بطور مرتب در کلاس مودند و به ناچار از مطالعه حذف شدند. این مطالعه از بهمن ماه در کلینیک دیابت بیمارستان علی اصغر اردبیل آغاز شد و ابتداء مطالعه مقدماتی بر روی بیمار انجام گردید این مطالعه مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش به روش فوق را مشخص ساخت. مطالعه اصلی در سال انجام گرفت. کل جمعیت مطالعه زیر سال بودند که همگی به طور مرتب در کلاس های آموزشی شرکت کردند و قبل از مطالعه از آنها رضایت گرفته شد. در مطالعه اصلی چون تعدادی از افراد مورد مطالعه بزرگسال و تعدادی کودک محسوب زان کالری مورد نیاز فرمول هاریس بندیکت در بزرگسال به شکل زیر []

$$\text{مردان} = \frac{W}{A} + (\frac{H}{A}) - (\frac{SF}{A})$$

$$\text{زنان} = \frac{W}{A} + (\frac{H}{A}) - (\frac{SF}{A})$$

W: وزن به کیلوگرم، H: اسن به سال SF: فاکتور استرس و فعالیت در کودکان کالری پایه کیلوکالری منظور شد و به ازای هر سال اسن در دختران کیلوکالری و در پسران کیلوکالری به مقدار پایه افزوده شد و پس از انجام آزمایشات قند خون HbA_{1C} و یادآمد خوراک، کلاس های آموزشی دایر گردید و در مورد کالری مورد نیاز هر بیمار چگونگی جایگزینی و محاسبه واحدهای غذایی با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده تامین کالری مورد نیاز از درشت مغذی ها در حد مناسب به آنها آموزش داده شد. پس از ماه مجدد آزمایشات و بررسی های فوق و یادآمد خوراک

دیابت قندی از شایع ترین بیماریهای مزمن امریکا و اروپا محسوب می شود % و % افراد بالای سال آنها به این بیماری مبتلا . دیابت نوع I در اروپا شایع تر می باشد و گفته می شود که شیوع آن در آسیا کمتر است [].

پیش بینی می شود که تعداد بیماران دیابتی در سال دو برابر شود، لذا هم اکنون تاکید زیادی بر روی کیفیت زندگی مهارت های خود مراقبتی و فهم بهتر بیماری شده است تا بیماران در درمان مشارکت بهتری داشته باشند []. رعایت دقیق الگوی درمان به همراه مراقبت های بهداشتی و روانی می تواند از عوارض بیماری دیابت پیشگیری کند [] و ناگاهی از فواید آموزش های خود مراقبتی می تواند باعث عدم حضور فقره مال بیمه ارzan در برنامه های خود مراقبتی شود []. به طور کلی رعایت رژیم غذایی حالت تجویزی کمتری داشته و بیشتر مسئولیت آن بر عهده بیمار می باشد []. از آنجا که کودکان و نوجوانان نسبت به محدودیت و اموری که باید برای مداوای خویش انجام دهند، مقاومت نشان می دهند و کمتر محدودیت ها را می پذیرند [] و بیماران دیابتی نوع یک بیشتر افراد زیر سال یعنی کودکان و نوجوانان می باشند. بنابراین تأثیر آموزش تغذیه را بر میزان قند خون و درشت مغذی های دریافتی آنها مورد بررسی قرار دادیم.

مواد و روش ها

امروزه رژیم غذایی یکسانی برای همه افراد نمی شود بلکه با توجه به شیوه زندگی و رفتاری فرد و نتایج رژیم غذایی بر کنترل پارامترهای متابولیک مثل قند خون، HbA_{1C} فشار خون و وزن، رژیم غذایی هر فرد کاملاً انحصاری تعیین می شود [].

مقدار درشت ذی ای دریافه ل و بعد از آموزش تفاوت آماری معنی داری وجود داشت ($P = /$) (جدول شماره) .

جدول شماره . درصد کالری حاصل از درشت مغذی های دریافته

قبل و بعد از آموزش		
کربوهیدرات	پروتئین	مقادیر کالری دریافته
قبل از آموزش / -	/ -	بعد از آموزش WHO
ددود		

HbA₁C اکثری (%) در سطح متوسط بود طبق تقسیم بندی HbA₁C بالای % کنترل ضعیف - - کنترل متوسط و بین - % کنترل خوب محسوب می گردد، بین تحصیلات و مقادیر دریافته درشت مغذی های رابطه معنی دار آماری دیده شد ($P < /$). سایر متغیرها و مقادیر قند خون و مقادیر دریافته درشت مغذی های رابطه معنی داری دیده نشد. میزان هیپو گلیسمی از / % کاهش یافته بود.

امروزه رژیم غذایی یکسانی برای تمام افراد مبتلا به دیابت توصیه نمی شود بلکه باستی با توجه به نیازهای منحصر به فرد هر شخص رژیم غذایی تنظیم شود. دیابت بیماری مزممی است که با رعایت توصیه های تغذیه ای کنترل بهتری دارد [] .

یافته ها نشان داد که قند خون بیماران قبل و بعد از آموزش تغییر کرده ولی رابطه آماری معنی دار دیده . محققین مطالعه حاضر گمان می کنند که این مسئله ناشی از همزمانی مطالعه با فصل امتحانات ده است چرا که امتحان یک عامل استرس زا بوده و بر میزان قند خون موثر است. مطالعات مختلف نشان داده که آموزش تغذیه ای و خود مراقبتی باعث

بیماران تمیه و نتایج قبل و بعد آموزش با استفاده از آزمون تی - زوج و نرم افزار Food Processor و SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

انداد کن درصد آزموده (%) در گروه سنی - سال بودند و میانگین سنی آنها ۶۵ سال بود. اکثریت بیماران (/ %) مؤنث بودند.

جدول شماره . توزیع فراوانی سن و جنس نمونه های مورد پژوهش

زیر سال
-
-

از نظر اقتصادی آزمودنی های مورد مطالعه به گروه، کم درآمد (کمتر از هزار تومان در ماه) هزار تومان در ماه) خوب یا ()

هزار تومان در ماه) تقسیم شدند که درآمد اکثریت هزار تومان در ماه) (/ % در سطح خوب بود. از نظر محل اقامت اکثریت (%) ساکن اردبیل و مابقی ساکن حومه و روستا بودند . انسولین دریافته اکثریت (%) IU/kg / و کمتر از g IU/kg / و مابقی (%) بالای kg / بود. میزان قند خون پس از آموزش کاهش یافته بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود (جدول شماره) .

جدول شماره . مقادیر قند خون قبل و بعد آموزش

بالای	زیر	قند خون
قبل از آموزش	-	قبل از آموزش
بعد از آموزش		

بین تحصیلات و مقادیر دریافت درشت مغذی ها رابطه آماری معنی دار دیده شد ($P < .$). تحقیقات متعدد نشان داده که تحصیلات بالاتر باعث درک عمیق تر و آگاهی توام با عمل در افراد می گردد و نهایتاً به نظر می رسد که مردم این منطقه توصیه های پزشک را جدی تر از توصیه های مسئولین تغذیه و آموزش می پذیرند و بهتر بدان عمل می کنند. این یافته فقط براساس تجربه بالینی پژوهشگر در طی Truswell مدت مطالعه بدست آمده است.

این یافته را تایید می کند بیماران نسخه دارویی را که از طرف پزشک ارا شود به رژیم غذایی که به آنها آموزش می دهند ترجیح داده و پزشک معالج خود را بیش از همه باور دارند [].

تشکر و قدردانی

در پایان از خانم ها فریده تقی زاده و فاطمه قنادی اصل و آقایان علی نعمتی، علی عابدی و م محترم کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نهایت تشکر و قدردانی را می نمایم.

1- Felig P, Frohman LA. Endocrinology and Metabolism 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2001: 829-43.

2- Heine RJ. Diabetes in the next century: challenges and opportunities. Neth J Med. 1999 Dec; 55(6): 265-70.

- میریان مهناز. بررسی نیاز آموزش مادران و کودکان مبتلا به دیابت سوم، ره سوم، صفحات .

4-Pinelli L, Mormile R, Gonfiantini E, Busato A, Kaufmann P, Piccoli R, et al. Recommended dietary allowances(RDA) in the dietary management children and adolescents with IDDM: an unfeasible target or an achievable cornerstone? J Pediatr Endocrinol Metab. 1998 Apr; 11 Suppl 2: 335-46.

ون بیم اران می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در افشار و همکاران که بر روی بیمار دیابتی نوع یک انجام گرفت حاکی از آن بود که پس از ماه آموزش میزان هیپر گلیسمی و قند خون ناشتا تغییر کرده است. که این تغییر از نظر آماری معنی دار بود []. در مطالعه دیگری روی بیمار دیابتی در طی ماه آموزش مشخص شد که قند خون این بیماران از mg/dl / mg/dl بافت و HbA_{1C} از % / % کاهش داشته است []. از طرفی برخی از مطالعات نشان داده اند که بیماران دیابتی کمتر از سال تمايل زیادی به مصرف شیرینی دارند []. در مطالعه فعلی همه بیماران زیر سال و اکثرآ محصل بودند و احتمالاً در مدرسه مجبور به مصرف نوشابه و تنقلاتی بوده اند ه بر قند خون آنها تاثیر مداخله ای داشته است.

همچنین نتایج نشان داد که مقدار درشت مغذی های دریافتی قبل و بعد از آموزش متفاوت بوده و رابطه آماری معنی دار وجود داشت ($P = .$) از آموزش حدود % انرژی مورد نیاز از پروتئین و % از کربوهیدرات و % از چربی تامین می شد که پس از آموزش / % از کربوهیدرات / % از / % از پروتئین دریافت شده است که این یافته ها با مقادیر توصیه ای WHO (- درصد کالری از کربوهیدرات % از چربی و - درصد از بروتئین) زگار بود []. بعلاوه یافته ها نشان داد که HbA_{1C} اکثر بیماران در سطح - درصد () بود و میزان بروز هیپو گلیسمی پس از آموزش کاهش یافته بود. یک بررسی بر روی بیمار دیابتی نشان داد که با آموزش های روزه و پیگری های بلند مدت تعداد دفعات هیپو گلیسمی از / درصد بوده است [].

- 11- Lurie AB. The Epidemiology of Diabetes Mellitus: an international perspective. Medicine & science in sports & Exercise. 2002 Oct; 34(10): 1694.
- رحمتکش محمد مهدی. بررسی عادات تغذیه ای و باورهای درمانی سنتی در بیماران مبتلا به دیابت در شهر یزد پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد.
- خلدی ناهید. اصول تغذیه رایینسون تهران
- 14- Pieber TR, Brunner GA, Schnedl WJ, Schattenberg S, Kaufmann P, Krejs GJ. Evaluation of a structured outpatient group education program for intensive insulin therapy. Diabetes Care. 1995 May; 18(5):625-30.

5- Truswell AS. What nutrition knowledge and skills do primary care physicians need to have, and how should this be communicated? Eur J Clin Nutr. 1999 May; 53 Suppl 2: S67-71.

- بنیاد امور بیماری های خاص دیابت و تهران صفحات

7- American Diabetes Association. Nutrition recommendations and principles for people with diabetes mellitus. Diabetes Care. 2000 Jan; 23 Suppl 1:S43-6.

8- Katz DL. Nutrition in Clinical Practice. philadelphia: lippincott; 2001:335.

9- Gehling E. Medical Nutrition Therapy: an individualized approach to treating diabetes. Lippincott's Case Management. 2001 Jan-Feb; 6(1):10-12.

- افشار محمود، صدر سید فخر الدین. اطهاری زاده محمود. تاثیر آموزش مراقبت از خود در بیماران دیابتی وابسته به انسولین ، سال دوم شماره دوم، صفحات